

بررسی عفونت داخل رحمی ناشی از انتقال عمودی در زنان مبتلا به کرونا ویروس

نویسنده اول^۱

نرجس سعادت‌مند

نویسنده مسئول^۲

لیلا نوروزی

^۱سازمان متبوع نویسنده اول

گروه مامایی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

ایمیل

narjes.saadatmand64@gmail.com

^۲سازمان متبوع نویسنده مسئول

گروه مامایی، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران، ایران

ایمیل

leilanorouzi1@gmail.com

چکیده - با گسترش بیماری کرونا در سرتاسر جهان، تمامی افراد از جمله زنان باردار در معرض ابتلا به این ویروس می باشند. زنان باردار به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی دوران بارداری مانند تغییرات قلبی-عروقی، آنمی، تغییرات متابولیک، نوسانات هورمونی تنگی نفس و احساس خستگی، نسبت به ویروس حساس تر هستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عفونت داخل رحمی ناشی از انتقال عمودی در زنان مبتلا به کرونا ویروس می باشد. در این تحقیق بصورت تحلیلی کتابخانه است، که از مقالات چاپ شده مرتبط با موضوع تحقیق در پایگاه ای اطلاعاتی Google، Scopus، Pubmed، Scholar، Cochrane، Science Direct، اطلاعات لازم بدست می آید. نتایج حاکی از آن است که، خصوصیات بالینی عفونت COVID-19 در زنان باردار مشابه موارد گزارش شده برای بیماران بالغ غیر باردار بود که دچار عفونت COVID-19 بودند. یافته های این گروه کوچک نشان می دهد که در حال حاضر هیچ شواهدی مبنی بر عفونت داخل رحمی ناشی از انتقال عمودی در زنانی که مبتلا به عفونت COVID-19 در اواخر بارداری هستند وجود ندارد.

کلید واژه - عفونت داخل رحمی، انتقال عمودی، زنان باردار، کرونا ویروس

بزرگسالان غیر باردار نشان می دهند، آیا کووید-۱۹ می تواند به صورت عمودی پخش شود و خطراتی برای جنین و نوزاد ایجاد کند یا خیر. پاسخ به این سؤالات برای تدوین اصول درمان زایمان برای زنان باردار مبتلا به عفونت COVID-19 ضروری است. بنابراین، برای تسهیل تلاش‌ها، چه در کشور و چه در سطح جهان، برای پیشگیری و کنترل اثر COVID-19 در کودکان و زنان باردار، ما به صورت تحلیلی-کتابخانه ای داده‌ها و اطلاعات از طریق مقالات و مجلات معتبر جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کردیم. در این تحقیق ویژگی‌های بالینی زنان باردار مبتلا

۱- مقدمه

پاندمی COVID-19 اولین بار در ووهان گزارش شد. استان هوبی چین، در دسامبر ۲۰۱۹ و به دنبال آن به سایر نقاط کشور شیوع پیدا کرد. ۱،۲ مطالعات و تحقیقات انجام شده عمدتاً بر بزرگسالان غیرباردار متمرکز بوده است [۱]. ویژگی‌های بالینی و پتانسیل انتقال عمودی پاندمی COVID-19 در زنان باردار ناشناخته است. سؤالاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از اینکه آیا زنان باردار مبتلا به COVID-19 علائم متمایز از