



تجویز ریبویرین در درمان تب خونریزی دهنده کریمه کونگو، زنگ خطری برای پیشگیری از بارداری

مهناز آریان^{۱*}، حسین علوی^۲ و فرشته قانع قصاب نوغان^۳

استادیار بیماری های عفونی و گرمسیری، گروه بیماری های عفونی بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران،
ArianM@mums.ac.ir

^۲دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران، AlaviH961@mums.ac.ir

^۳دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران، GhaneF901@mums.ac.ir

چکیده - تب خونریزی دهنده کریمه کونگو (CCHF) یک عفونت حاد منتقله از کنه با خطر جدی به خصوص در بارداری می باشد، به طوری که مورتالیتی آن در این گروه از آنچه در جمعیت عمومی دیده می شود به طور قابل توجهی بالاتر است. همچنین عدم توجه به اصول پیشگیری از بارداری در طی درمان آنتی-ویرال با ریبویرین و تا شش ماه پس از آن به دلیل تراتوژنیسیته دارو می تواند آسیب های جبران ناپذیری به جنین تحمیل کند. در این مطالعه به بررسی میزان آگاهی افراد مبتلا به بیماری CCHF از تراتوژنیسیته دارو و مدت زمان پیشگیری از بارداری پرداخته شد و علاوه بر آن پیامد بارداری در طی دوران شش ماه پس از مصرف ریبویرین مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه ۱۷۷ بیمار CCHF بررسی شده و اطلاعات مربوط به آموزش یا عدم آموزش هنگام ترخیص درباره بارداری برای ۸۴ بیمار قابل دسترسی بود، تنها ۹ نفر (۵.۱٪ از کل بیماران) درباره توجه به پیشگیری از بارداری پس از درمان با ریبویرین آموزش گرفته بودند. در پیگیری بیماران، ۳ مورد بارداری منجر به سقط و ۷ فرزند غیر سالم به دلیل عدم توجه به اصول پیشگیری از بارداری در زمان مصرف ریبویرین و ۶ ماه پس از آن گزارش شد.

کلید واژه - پیشگیری از بارداری، تب خونریزی دهنده کریمه کونگو، تراتوژنیسیته، دوران بارداری، ریبویرین

۱- مقدمه

می باشد، گرچه ریبویرین به عنوان درمان آنتی-ویرال در بسیاری از مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم اینکه تجویز فرآورده های خونی در صورت لزوم و فراهم سازی مداخلات مراقبت های ویژه می تواند پیامد بیماری را بهبود بخشد، Case Fatality Rate (CFR) همچنان بالا و بین ۴ تا ۲۰ درصد می باشد. (۱)

گرچه تغییرات سیستم ایمنی در بارداری به طور کامل شناخته نشده اند، خانم های باردار احتمال بالاتری برای ابتلا به بعضی از بیماری های عفونی از جمله توکسوپلاسموز و نیز اشکال شدید

تب خونریزی دهنده کریمه کونگو (Crimean-Congo hemorrhagic fever - CCHF) یک عفونت حاد منتقله از کنه و خطری جدی به عنوان یک بیماری عفونی نوپدید است. همچنین منطقه جغرافیایی وسیعی را از جمله ترکیه، روسیه، قزاقستان، و ایران در برمی گیرد، اما تاخیر در تشخیص و عدم گزارش سیستماتیک همچنان در مورد این بیماری مطرح است. تب، ترومبوسیتوپنی، و خونریزی از تظاهرات بالینی شاخص این بیماری می باشد. اقدامات حمایتی از اصول درمان بیماری CCHF