

بررسی دیرینه شناسی و چینه شناسی سازند کلات در برش دریاچه بزنگان (کل بی بی)

- آریابی - علی اصغر^۱ ، ترشیزیان - حبیب الله^۲ ، سمیرا کراچیان^{*}^۳
۱ - دکترا زمین شناسی ، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۲ - دکترا زمین شناسی ، عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۳ - دانشجو کارشناسی ارشد زمین شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Samirakerachian@gmail.com

چکیده:

سازند کلات یکی از بازترین و جوانترین واحد ها در شرق حوضه رسوی کپه داغ به سن مائیستریشتین می باشد که به وضوح صخره ساز شده است. این سازند بیشتر از سنگ آهک ماسه ای، سنگ آهک بایوکلاستی، شیل و ماسه سنگ تشکیل شده است. مهمترین گسترش سازند کلات در ناحیه کپه داغ در برش تنگه نیزار است. سازند کلات در برش مورد مطالعه (ارتفاعات مجاور دریاچه بزنگان) و در ۱۱ کیلومتری غرب مقطع تیپ (تنگه نیزار) قرار گرفته است، براساس مطالعات انجام شده دارای بیشترین فسیل گاستروپود Otostoma tchiatcheffi d'archiac می باشد. و چون در کنار راه اصلی واقع شده است دسترسی به آن بسیار آسان می باشد.

ضخامت سازند کلات در این برش ۲۳۲ متر اندازه گیری شده است که نسبت به برش الگو از ضخامت کمتری برخوردار است. و با توجه به محتويات وجایگاه چینه شناسی،^۴ عضو^۵ از عضو برش الگو در این برش مورد مطالعه قرار گرفته شده است. مرز زیرین سازند کلات با سازند نیزار بصورت ناپیوستگی فرسایشی همراه با یک لایه از خاک قدیمه (Paleosol) می باشد، مرز فوقانی این سازند با رسوبات قرمز رنگ سازند پسته لیق دست خوش فعالیتهای تکتونیکی و عوامل کوهزایی شده است، که این فعالیتها باعث بوجود آمدن دریاچه بزنگان در دوران دوم تا سوم زمین شناسی شده است. سازند کلات دارای دو فاسیس آواری و کربناته می باشد که فاسیس آواری آن در یک محیط کم عمق ساحلی و فاسیس کربناته در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ بر جای گذاشته شده است.

برش مورد مطالعه همانند برش الگو دارای یک لایه صدف سنگ دوکفه ای در قاعده سازند می باشد در لایه های نزدیک به قاعده شیل فوقانی، سنگواره گاستروپودی اتوستوما چیاچفی وجود دارد که تجمعی از آنها مشخص کننده آشکوب مائیستریشتین می باشد. گاستروپود فوق تانگه و دماغه ناویدیس چهل کمان و برخی از بخش‌های برش گرو و دریند نادری نیز مشاهده می شود.

واژه های کلیدی : کپه داغ ، مائیستریشتین ، سازند کلات ، بزنگان ، گاستروپود .

مقدمه:

حوضه رسوی کپه داغ در منتهی الیه شمال شرق ایران در عرض جغرافیایی ۳۰° تا ۳۸° شمالی و طول جغرافیایی ۴۱° تا ۴۵° و ۵۴° شرقی قرار گرفته است (افشار حرب ۱۳۷۳). این حوضه علاوه بر ایران