

تعیین اثر متوكلوبیرامید، پروپوفول و دگزامتاژون در کنترل تهوع و استفراغ حین سزارین اورژانس با بی‌حسی نخاعی

دکتر شیرین پازوکی^{۱*}، مهری اسکندری^۲، ساره معماری^۳، دکتر افسانه نوروزی^۱، دکتر افسانه زرگنج فرد^۳

۱- استاد یار، گروه بیهودشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲- کارورز پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

۳- استادیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اراک

تاریخ دریافت ۱۳/۲/۸۵، تاریخ پذیرش ۳۰/۲/۸۵

چکیده

مقدمه: بی‌حسی نخاعی شیوه‌ای متدال جهت بیهودشی در سزارین است که تهوع و استفراغ حین عمل (IONV) از مشکلات شایع این فرآیند به شمار می‌رود. جهت پیش‌گیری از این عارضه و خطرات آن، از داروهای ضد استفراغ استفاده می‌شود. متوكلوبیرامید متدال ترین دارو در جلوگیری از IONV می‌باشد اما احتمال بروز عوارض اکستراپیرامیدال در آن و همچنین وجود خواص ضد تهوع و استفراغ در پروپوفول و دگزامتاژون، باعث شد این مطالعه جهت مقایسه اثر این داروها انجام شود.

روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی می‌باشد. ۱۴۴ خانم باردار که تحت عمل سزارین اورژانس قرار گرفتند و ناشتا نبودند، به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول متوكلوبیرامید ۱/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت وریدی، گروه دوم دگزامتاژون ۱۵۰ میکروگرم بر کیلوگرم به صورت وریدی، گروه سوم پروپوفول ۱/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم هر پنج دقیقه از زمان بستن بند ناف تا پایان عمل و گروه چهارم ۲ میلی لیتر آب مقطر دریافت کردند. در مدت عمل بیماران از نظر شدت تهوع، وجود استفراغ و اوغ زدن بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون کراسکال والیس و آنالیز واریانس یک طرفه انجام گرفت.

نتایج: میزان بروز تهوع در پروپوفول کمترین و در دگزامتاژون بیشترین مقدار بود. بین دگزامتاژون و دارونما تفاوت آماری معنی‌داری وجود نداشت. کمترین درصد بروز استفراغ مربوط به متوكلوبیرامید و پروپوفول بود و بین این دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری وجود نداشت. همچنین کمترین درصد اوغ زدن حین سزارین اورژانس مربوط به گروه دریافت کننده پروپوفول بود.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه اثرات ضد استفراغ پروپوفول و متوكلوبیرامید مشابه بودند. تأثیر پروپوفول در کاهش اوغ زدن تا حدودی بیشتر از متوكلوبیرامید بود. اما شیوه تجویز پروپوفول ساده و ارزان و بدون عوارض جانبی است. مصرف این دارو حین سزارین اورژانس توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: بی‌حسی نخاعی، سزارین، استفراغ حین عمل، متوكلوبیرامید، پروپوفول

*تویینده مسئول: اراک، بیمارستان طالقانی، اتفاق عمل، تلفن: ۰۲۷۷۶۰۶۳-۵

E-mail: shirin_pazoki@yahoo.com