

گزارش یک مورد گلومرولونفریت فوکال سگمنتال ناشی از دی پنی سیلامین در یک بیمار مبتلا به اسکرودرمی

دکتر صهبا چهرئی^۱، دکتر علی چهرئی^۲، دکتر هادی پورمقیم^۳

۱- استادیار، فوق تخصص روماتولوژی، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲- دستیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳- روماتولوژیست، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ دریافت ۸۴/۱۱/۳، تاریخ پذیرش ۸۵/۲/۲۵

چکیده

مقدمه: استفاده درمانی از دی پنی سیلامین همراه با عوارض گوناگونی می باشد. شایع ترین عارضه آن، پروتئینوری ناشی از دی پنی سیلامین است که اغلب ناشی از گلومرولوپاتی از نوع ممبرانو می باشد. در این مقاله یک مورد گلومرولونفریت نوکال سگمنتال ناشی از دی پنی سیلامین در یک بیمار مبتلا به اسکرودرمی گزارش شده است.

مورد: در این مقاله به شرح بیماری پرداخته شده است که به مدت ۱۸ ماه تحت درمان با دی پنی سیلامین بود و به علت درگیری کلیوی از نوع FSGN دچار پروتئینوری در حد سندرم نفروتیک شد. یک ماه پس از قطع درمان و بدون هیچ درمان اضافی دیگر، پروتئینوری بیمار بر طرف شد. بیمار نام برده هیچ علامتی به نفع بحران کلیوی ناشی از اسکرودرمی نداشت.

نتیجه گیری: در این مورد خاص دی پنی سیلامین مسئول ایجاد گلومرولونفریت فوکال و سگمنتال کلیه بیمار بوده است. لازم به ذکر است که تاکنون این نوع پاتولوژیک درگیری کلیوی به دنبال درمان با دی پنی سیلامین گزارش نشده است. **واژگان کلیدی:** گلومرولونفریت فوکال سگمنتال، اسکروز سیستمیک، دی پنی سیلامین، سندرم نفروتیک، پروتئینوری

نویسنده مسئول: اراک، بیمارستان ولی عصر (عج)، تلفن ۲۲۴۹۷۰۰

E-mil: chereei_s@yahoo.com