

گزارش یک مورد آنوریسم کاذب شریان فمورال سطحی

دکتر احمد رضا بهروزی^{۱*}، دکتر محمود امینی^۲

۱- متخصص ارتوپدی، مرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج) اراک

۲- استادیار، فوق تخصص جراحی قفسه سینه، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

تاریخ دریافت ۸۵/۱۲/۲، تاریخ پذیرش ۸۶/۱۰/۵

چکیده

مقدمه: آنوریسم کاذب یک هماتوم ضریان دار است که به صورت عارضه خونریزی دهنده در بافت نرم ایجاد می شود که در اکثر موارد عروق محیطی را درگیر می کند. آنوریسم کاذب شریان فمورال عارضه نادری است که به طور عمده به دنبال کاتتریزاسیون قبلی شریان رخ می دهد اما به ندرت ممکن است با تروما نیز ایجاد شود. در این مقاله یک مورد آنوریسم کاذب شریان فمورال معرفی می شود.

مورد: بیمار خانمی است ۲۴ ساله که ۱۰ روز پیش از مراجعه به دنبال سقوط، دچار زخمی در بخش خلفی تحتانی ران پای راست شده و تحت ترمیم پوست قرار گرفته است. بعد از یک هفته به تدریج درد و تورم پیشرونده ناحیه تحتانی ران و زانو، تب و لرز و لنگش برای بیمار ایجاد شده است. در معاینه فلکسیون ۹۰ درجه زانو، تورم، گرمی و تندرns ناحیه تحتانی ران مشهود بود. نبض دورسالیس پدیس و تیبیالیس خلفی لمس نمی شد. برای بیمارآزمایش خون، گرافی ساده، سونوگرافی داپلرو MRI اندام تحتانی راست انجام شد و در نهایت با تشخیص آنوریسم کاذب شریان فمورال، تحت عمل جراحی برداشتن توده و پیوند از ورید صافن پای مقابل قرار گرفت.

نتیجه گیری: در بیماران با سابقه ترومای نفوذی و علائم ناشی از عفونت، بایستی به احتمال ایجاد آنوریسم کاذب توجه داشت. در این موارد انجام سونوگرافی برای تشخیص قطعی ضروری است و اندازه آنوریسم و علائم بیمار تعیین کننده روش درمان می باشند.

واژگان کلیدی: آنوریسم کاذب، شریان فمورال، عروق، محیطی، آنوریسم

*نویسنده مسئول: اراک، بیمارستان ولی عصر، گروه جراحی

Email: dr_Amini@yahoo.com