

گزارش یک مورد آدنوکارسینوم اولیه ناحیه آپاندیس

دکتر فتح اله محقی

استادیار، متخصص رادیوتراپی - انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اراک

تاریخ دریافت ۸۶/۲/۴، تاریخ پذیرش ۸۶/۸/۳۰

چکیده

مقدمه: آدنوکارسینومای اولیه آپاندیس، سرطانی نادر است که تعداد معدودی در جهان گزارش شده است. حدود یک صدم تا دو دهم درصد از سرطان‌ها و کمتر از نیم درصد از سرطان‌های دستگاه گوارش را شامل می‌گردد. در این مقاله یک مورد آدنوکارسینوم اولیه ناحیه آپاندیس معرفی می‌شود.

مورد: بیمار، مرد ۳۸ ساله‌ای است که با درد شکم و تندرینس در ناحیه مک بورنی و در ربع تحتانی راست شکم، حدود ۸ ماه پیش در بیمارستان بستری و با تشخیص آپاندیسیت حاد تحت عمل جراحی آپاندکتومی اورژانس قرار گرفته است. پاتولوژیست، آدنوکارسینوم آپاندیس را گزارش نمود که تومور تا ناحیه سروز آپاندیس گسترش داشته است. پس از جراحی، بیمار از پی‌گیری منظم امتناع می‌ورزد و شش ماه بعد با تنگی نفس و درد شکم مراجعه، و براساس سونوگرافی و گرافی‌های انجام شده، دارای آسیت وسیع شکمی بوده است.

نتیجه‌گیری: در بیماران آپاندیس حاد، باید احتمال آدنوکارسینوم آپاندیس را نیز در نظر گرفت.

واژگان کلیدی: آدنوکارسینوم آپاندیس، آپاندیسیت حاد، آپاندکتومی

*نویسنده مسئول: اراک، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز آموزشی درمانی ولیعصر(ع)

Email: Mohagheghfirt@yahoo.com