

## (گزارش موردي)

# Orf همراه با اریتم مولتی فرم

مریم عزیززاده (M.D)

۱- دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیمارستان فاطمیه(س)

## چکیده

بیماری Orf یک بیماری ویروسی ناشی از پاراپاکس ویروس‌ها است (ویروس‌های DNA دار دو رشته‌ای) که در بز و گوسفند ایجاد بیماری می‌کند و انتقال به انسان از طریق تماس مستقیم با ضایعات فعال و ندرتاً از طریق وسایل آلوده رخ می‌دهد. اگر چه این بیماری در انسان self-limited بوده و معمولاً عارضه‌ای ندارد، ما یک مورد از Orf همراه با اریتم مولتی‌فورم در یک خانم ۵۴ ساله گزارش می‌کنیم.

## واژه‌های کلیدی: Orf، پاراپاکس ویروس، اریتم مولتی فورم

تشخیص می‌تواند مفید باشد. بیماری طی ۴ تا ۵ هفته بدون درمان اختصاصی بهبود می‌یابد [۲]. سیر بیماری Orf می‌تواند عارضه‌دار شده و عفونت ثانویه باکتریال، لفادنویاتی، لنفاژیتی، ضایعات گستردۀ پاپلووزیکولار و اریتم مولتی فورم به همراه بیماری رخ دهد [۴].

## مقدمه

بیماری Orf که همچنین ecthyma contagiosum و contagious pustular dermatosis sheep pox نامیده می‌شود، یک بیماری ناشی از پاراپاکس ویروس‌ها است که انتشار جهانی داشته و به طور شایع در گوسفند و بز ایجاد بیماری می‌کنند [۱].

در گوسفندان خود را به صورت یک درماتیت پوچولار و یا بصورت ضایعات وزیکولار دهانی نشان می‌دهد. در انسان معمولاً یک ضایعه منفرد در محل انتقال عفونت رخ می‌دهد. این ضایعه غالباً بدون هیچ عارضه‌ای بهبود می‌یابد. اگرچه عفونت ثانویه باکتریال ناشایع نیست [۲]. ضایعه در انسان به شکل یک پاپول کوچک قرمز تا آبی و سفت می‌باشد که بتدريج بزرگ‌تر شده و یک پاسچول همورازیک یا تاول ایجاد می‌کند که معمولاً در مرکز crusted می‌شود [۳].

در موارد تپیک تشخیص بر اساس تاریخچه تماس با حیوان آلوده است، میکروسکوپ الکترونی نیز در تأیید

## گزارش مورد

بیمار خانم ۵۴ ساله‌ای بود که به علت ضایعات خارش دار اریتماتو به درمانگاه پوست بیمارستان فاطمیه سمنان مراجعه کرد. ضایعات دو روز پیش از مراجعه از دیستال اندام‌ها شروع و به پروگریمال اندام‌ها و تنۀ گسترش پیدا کرده بود.

در سابقه پزشکی، بیمار وجود یک ضایعه تاولی را روی انگشت چهارم دست چپ از حدود دو هفته پیش ذکر می‌کرد که چند روز بعد از تمیز کردن کله و پاچه گوسفند رخ داده بود و با وجود دستکاری و تخلیه توسط بیمار همچنان وجود داشت. بیمار اظهار داشت هنگام تمیز کردن کله گوسفند