

سرطان معده

دکتر محمد بابائی بروجنی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

خلاصه:

یک بررسی گذشته‌نگر بر روی ۴۶ بیمار مبتلا به سرطان معده، که در طی سالهای ۱۳۶۷-۱۳۷۱ به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) تهران، و بیمارستان شفیعیه زنجان، مراجعه نموده بودند، انجام شد. در این مطالعه حداکثر سن، مربوط به یک زن ۸۷ ساله، و حداقل سن هم [مربوط به] یک زن ۲۸ ساله بوده و متوسط کلی سن هم ۵۷/۹۶ سال بوده است. شایعترین علت مراجعه بیماران، درد اپیگاستر بوده (۷۱/۷٪) و شایعترین نشانه، کاشکسی (۶۳٪) بوده است از نظر محل ابتلا، شایعترین محل آنتروم معده می‌باشد و از نظر آسیب‌شناسی بیشترین نوع، آدنوکارسینوما (۴۰ بیمار) است. برای اکثریت بیماران، انجام عمل اصلی (کورتاژیو) امکان‌پذیر بوده است. (۲۴ بیمار/۵۴٪). در یک بررسی آماری که طی سال ۷۱ تا نیمه اول سال ۷۲ انجام گرفته است (بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شفیعیه) از مجموع ۲۱۲ بیمار مبتلا به بدخیمی؛ ۴۴ بیمار مبتلا به سرطان معده بوده‌اند؛ که اولین درجه شیوع، در بین تمام انواع بدخیمی بیماران داشته است و در همین جمع‌آوری آماری، سرطان‌های دستگاه گوارش و پرتونیوم در رأس همه انواع [دیگر] قرار دارد. (۱۲۶ بیمار از مجموع ۲۱۶ بیمار). با توجه به این شیوع بالای بیماری لازم است بیماران هرچه زودتر تشخیص داده شوند و اقدام جدی بعمل آورده شود.

مقدمه:

تمام سرطان‌ها دارد و سرطان دستگاه گوارش هم در رأس همه دستگاه‌های دیگر بدن قرار دارد. (بیماران مراجعه‌کننده سرطانی به بیمارستان شفیعیه زنجان) (جدول ۱ و نمودار ۱-۲).

سرطان معده، یکی از سرطان‌های شایع در ایران است؛ که مرگ و میر قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. و طی بررسی آماری، از تمام بیماران مبتلا به سرطان، که در طی سال ۷۱ و نیمه اول سال ۷۲، بعمل آمده است، سرطان معده، اولین شیوع را در بین