

بررسی میزان کاهش شنوایی در بیماران مبتلا به نارسائی مزمن کلیه که در بخش دیالیز بیمارستان دکتر بهشتی زنجان مورد همودیالیز قرار گرفته‌اند

دکتر سعید طلائی *

خلاصه:

کاهش شنوایی یک مسئله شناخته شده در جریان نارسائی کلیه می‌باشد. دلایل زیادی وجود دارد که کاهش شنوایی را در بیماران باتارسائی کلیه توجیه می‌کند که برخی از آنها به دلیل شباهت بین کلیه و گوش داخلی تکیه دارند.

در این مطالعه ۳۳ نفر از بیمارانی که در بخش همودیالیز بیمارستان دکتر بهشتی دیالیز می‌شوند شنوایی سنجی شدنده که ۲۵ نفر از بیماران کاهش شنوایی حسی و عصبی در فرکانس‌های بالای HZ ۲۰۰۰ داشتند. چون کاهش شنوایی معمولاً در فرکانس‌های بالا است از نظر کلینیکی برای این بیماران اشکال قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.

واژه‌های کلیدی: ایران، زنجان، دانشگاه علوم پزشکی، نارسائی مزمن کلیه CRF، کاهش شنوایی حسی و عصبی (SNHL)

مقدمه:

سایر ارگانها و سیستمهای بدن بارزتر می‌شود از جمله می‌توان به اختلالات اتووستیبولر اشاره کرد. در این بیماران کاهش شنوایی غالباً از نوع حسی عصبی می‌باشد که بیشتر فرکانس‌های بالا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دلایل بسیاری وجود دارد از جمله آن‌می، عفونتها، بیماریهای عمومی مثل دیابت قندی، فشار خون بالا، آرتروپاکلروزیس و همینطور استفاده از داروهای اتو توکسیک و تغییرات همودینامیک که بعلت همودیالیز یا پیوند کلیه که وجود هر کدام از آنها می‌تواند حلزون گوش را آزرده نماید (۲). در این مطالعه ۳۳ نفر از بیمارانی که در بخش دیالیز

نارسائی مزمن کلیه به عنوان مرحله آخر بیماری یک اختلال عمومی شدیدی می‌باشد که نه تنها سبب بهم خوردن تعادل آب و الکترولیت بدن می‌شود، بلکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم اعضاء مختلف دیگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نهایتاً سبب اختلال آنها می‌گردد (۱).

پیشرفت‌های زیادی امروز در نحوه اداره بیماران دیالیزی یا آنها که تحت عمل پیوند کلیه قرار می‌گیرند صورت گرفته، سبب شده که بطور شگفت‌انگیزی امید به زندگی در این بیماران افزایش یابد و با افزایش طول عمر آنان و کنترل بیماری کلیوی مسائل و مشکلات در