

## بررسی ۱۰ ساله همانژیومها از نظر علائم بالینی، نحوه درمان و خصوصیات دموگرافیک در مراکز آموزشی شهر اصفهان

دکتر حیدر علی داوری \* دکتر محسن کلاهدوزان \*\* دکتر مهدی راستی \*\*

### خلاصه:

همانژیومها در ۲/۵ درصد شیر خواران یافت می شود. منشاً همانژیومها و سایر ضایعات عروقی روشن نیست اما تیجه اشتباه در امپریوژن می باشد. همانژیومها با توجه به ظاهر ناخوشایند و فراوانی آنها در سر و گردن توجه والدین را به خود جلب و آنها را مجبور به مراجعه به پزشک می کنند.

در این مطالعه علائم بالینی، علت مراجعه، خصوصیات دموگرافیک و نحوه درمان بیماران مبتلا مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که برای اداره کردن بیماران مبتلا آگاهی از این موارد الزامی است. در این مطالعه که به صورت آینده نگر و توصیفی از ابتدای سال ۱۳۶۵ به مدت ۱۰ سال انجام شد؛ تمام بیماران مراجعه کننده با تشخیص همانژیوم به بیمارستانهای اصفهان از نظر خصوصیات دموگرافیک، علت مراجعه، نحوه درمان مورد بررسی قرار گرفتند.

همانژیومها بیشترین فراوانی را در گروه سنی ۱-۵ سال و پس از آن در گروه سنی زیر یکسال داشته‌اند. (به ترتیب ۳۵ و ۲۸ درصد) دختران ۶۲ درصد و پسران ۳۸ درصد بیماران را تشکیل داده‌اند، به این ترتیب نسبت زن بر مرد  $\frac{1}{6}$  است. سروگردان با ۵۴ درصد، تن به ۲۴ درصد شایعترین مناطق درگیر بوده‌اند. ۸۲ درصد بیماران با روش‌های جراحی درمان شده اند و همانژیوم نوع مویرگی شایعترین نوع در بیوپسی بوده است. مهمترین علت مراجعه بیماران؛ ضایعه بدون علامت ۲۸٪ و درد و تورم ۲۳٪ بودند. در این مطالعه همانند سایر مطالعات؛ سر و گردن شایعترین محل درگیری می باشد. اما آنچه که با سایر گزارشها تفاوت اساسی دارد استفاده بسیار زیاد جراحی برای درمان بوده است. به طوریکه ۸۲ درصد بیماران با روش‌های اکسزیون جراحی بهبود یافته اند و حال آنکه در برخی گزارشات این میزان حدود ۳۰ درصد بوده است. نکته مهم دیگر فراوانی گروه خونی A در بیماران است. به طوریکه تقریباً نیمی از مبتلایان گروه خونی A داشته اند و حال آنکه نسبت نرمال این میزان در حدود ۱۷/۵ درصد می باشد که جای تأمل دارد.

واژه‌های کلیدی: ایران، اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی،

*aspect*

\* فوق تخصص جراحی اطفال؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان.

\*\* دستیار رئیسه جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.