

بررسی فراوانی نسبی فتقهای جدار شکم و عوارض آنها از فروردین ۷۷ لغایت تیرماه سال ۷۸ در بیمارستان شفیعیه زنجان

دکتر کریم سعادت

خلاصه :

فتقهای جدار شکم از بیماریهای بسیار شایع در انسان می باشند. زن و مرد هر دو به فتق جدار شکم مبتلا می شوند. این بیماری در تمام گروههای سنی شایع است. شیوع آن در زن و مرد و سنین مختلف متفاوت است. این بیماری ۷٪ مراجعات سرپائی به درمانگاههای جراحی عمومی و حدود ۱۲٪ وقت اتاق عمل بیمارستانها را به خود اختصاص می دهد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی نسبی انواع فتقهای جدار شکم و تعیین فراوانی نسبی عوارض ناشی از آن می باشد. در این مطالعه توصیفی پرونده بیماران بستری و عمل شده به علت فتق در بیمارستان شفیعیه زنجان در مدت ۱۵ ماه از تاریخ (۷۷/۱/۱) الی (۷۸/۴/۱) مورد مطالعه قرار گرفت.

پرسشنامه برای تمام بیماران پر شد و سپس تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت. در این مطالعه ۹۳۳ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. فتق اینگوینال با شیوع ۸۱/۵٪ شایعترین فتق و فتق فمورال با شیوع ۱/۴٪ نادرترین فتق بودند. ۸۰/۸ درصد فتقها بدون عارضه و ۱۹/۲ درصد فتق ها عارضه دار بودند. ۸۲/۹ درصد کل بیماران مرد و ۱۷ درصد بیماران زن بودند. ۱۴/۴ درصد فتقها انکارسره ۲/۲ درصد استرانگوله ، ۴۳ درصد همراه انسداد روده ، ۸۱/۵٪ فتق اینگوینال (۵۱/۴٪ فتق اینگوینال راست ۲۵/۵٪ فتق اینگوینال چپ ، ۷/۲۹٪ فتق اینگوینال دوطرفه) ، ۴/۹٪ فتق نافی ، ۳/۵٪ فتق اپی گاستر و ۱/۴٪ فتق فمورال بودند. لازم است در مورد علائم بیماری فتق و عوارض آن اطلاعات کافی توسط پزشکان و دست اندرکاران بهداشت و درمان کشور به مردم داده شود تا به موقع مراجعه و تحت درمان قرار گیرند.

واژه های کلیدی : فتق ، گرافتادن ، اختناق و انسداد روده

مقدمه :

فتق عارضه دار تبدیل خواهد شد. فتق عارضه دار مشکلات زیادی دارد و میزان مرگ و میزان ناتوانی در فتق های عارضه دار زیادتر است. میزان اقامت در بیمارستان زیادتر و هزینه درمان فتق عارضه دار بیشتر از فتق معمولی است مطالعات زیادی در جهت تعیین

فتقهای جدار شکم از بیماریهای شایع در انسان می باشد که تمام گروههای سنی و هر دو جنس را گرفتار می کند. فتق های جدار شکم نیاز به عمل جراحی دارند که در اولین فرصت باید انجام شود (۱). اگر به موقع عمل جراحی صورت نگیرد فتق معمولی به