

گزارش یک مورد پانکراتیت پس از بای پاس قلبی و تنفسی

دکتر فرشید رضوی

متخصص جراحی عمومی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

خلاصه:

پانکراتیت حاد از عوارض اعمال جراحی شکمی و ندرتاً اعمال جراحی خارج از شکم محسوب می‌شود که تشخیص آن مشکل بوده ولی تشخیص به موقع آن حائز اهمیت می‌باشد، پانکراتیت پس از عمل از میزان مرگ و میر بالایی برخوردار است.

است.

سایر عوامل شامل هیپرکلسمی، هیپرلیپیدمی، پانکراتیت فامیلی، کمبود پروتئین، پانکراتیت پس از عمل، داروها، انسداد مجاری، پانکراس دوشاخه، التهاب مزمن پایی و اتر و پانکراتیت ایدیوپاتیک می‌باشد.

معرفی بیمار:

بیمار مرد جوان بیست ساله، محصل، ساکن زنجان، که حدود یکسال قبل بیماری قلبی تحت عنوان تنگی دریچه آنورت در وی تشخیص داده شده است. بیمار در شرح حال هیچگونه سابقه بیماریهای خانوادگی را ذکر نمی‌نماید. به بیماریهای جهاز هاضمه مبتلا نبوده و هیچگونه اعتیاد دارویی و غیره نداشته است. بیمار در تاریخ ۲۱ اسفندماه تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و در پیچه فلزی آنورت برای وی گذاشته شده است. بیمار پس از عمل، از داروی وارفارین و سایمتدین استفاده کرده است. و در تاریخ ۷۴/۱/۱۶ مبتلا به درد شدید شکمی شده که بصورت منتشر بوده و همراه آن تهوع و استفراغ نیز وجود داشته که به درمانگاه مراجعه کرده و بصورت سربایی تحت درمان سرم‌تراپی قرار گرفته است. ولی درد بیمار بهبود پیدا نکرده و مکرراً دچار استفراغ شده تا اینکه دو روز بعد بیمار به اورژانس بیمارستان شفیعیه مراجعه و

مقدمه:

پانکراتیت حاد، التهاب غیر باکتریال پانکراس بوده که توسط فعال شدن، آزاد شدن و هضم غده توسط آنزیم‌هایش ایجاد می‌گردد. ممکن است یک تا چند حمله بیماری در طی یک دوره اتفاق افتد. در کشورهای غربی شایعترین علت پانکراتیت سنگ‌های صفراوی می‌باشد در طی یک پانکراتیت خفیف تغییرات مورفولوژیک بصورت ادم پانکراتیک یا پری پانکراتیک، نکروز چربی وجود داشته ولی نکروز پانکراس وجود ندارد که به آن پانکراتیت ادماتو گفته می‌شود. این حالت می‌تواند به حالت شدید آن یعنی پانکراتیت هموراژیک یا نکروزانت تبدیل شود. در حالت شدید، نکروز وسیع پانکراس و چربی اطراف پانکراس و خونریزی به داخل پانکراس اتفاق می‌افتد. در طی بیماری اعمال غدد اگزوکرین و آندوکرین پانکراس برای چند هفته تا چند ماه دچار اختلال می‌شود.

در صورتیکه علت پانکراتیت و عوارض آن حذف گردند، پانکراس به وضع عادی برخواهد گشت. از نظر اتیولوژی سنگهای صفراوی علت ۹۰٪ پانکراتیت‌های حاد و الکلی عامل ۴۰٪ تمام موارد پانکراتیت در کشورهای غربی