

سارکوم استرومای آندومتر با درجه پایین: گزارش موردی

چکیده

در این گزارش خانم ۳۷ ساله‌ای معرفی می‌گردد که در سال ۱۳۷۴ به علت خونریزی غیرطبیعی رحم تحت عمل هیستریکتومی قرار گرفت و نتیجه بررسی پاتولوژی آن سارکوم استرومای آندومتر با درجه پائین گزارش شد. در آن زمان هیچ گونه درمان تکمیلی خاصی برای بیمار انجام نشد و بیمار در مرتبه دوم به علت وجود توده در واژن مراجعه نمود. حین لاپاراتومی توده‌های متعددی در کف لگن بین مثانه، کولون، کاف واژن و قسمت قدامی پریتون دیده شد و در بررسی پاتولوژی نیز عود سارکوم استرومای آندومتر با درجه پائین گزارش گردید.

*دکتر امیر مهدی میرناطقی I

دکتر محمد یونسی II

دکتر سیدحسن فرزانه III

کلید واژه‌ها: ۱- توده داخل رحم ۲- خونریزی غیرطبیعی رحم
۳- سارکوم استرومای آندومتر

مقدمه

سارکومهای رحم تومورهای نسبتاً نادری با منشأ مزودرمال می‌باشند که ۶-۲ درصد بدخیمیهای رحم را شامل می‌شوند (۱ و ۲). سه گروه از شایعترین انواع آن عبارتند از سارکوم آندومتر، لیومیو سارکوم و Malignant mixed mullerian tumor.

سارکوم استرومای آندومتر بصورت اولیه در زنان حوالی منوپوز (perimenopausal) و در حدود سنین ۵۰-۴۵ سالگی دیده می‌شود. در یک سوم موارد نیز بعد از منوپاز بروز می‌کند. این عارضه ارتباطی به تعداد حاملگی (parity) و بیماریهای همراه و یا رادیوتراپی قبلی ندارد (۲ و ۳).

شایعترین علامت آن خونریزی غیرطبیعی رحم (Abnormal Uterin Bleeding, AUB) می‌باشد. درد شکم و احساس فشار بدلیل توده بزرگ لگنی با شیوع کمتر

دیده می‌شود و عده‌ای از بیماران نیز بدون علامت می‌باشند (۲، ۳ و ۴).

در معاینه لگن معمولاً بزرگی نامنظم و یا منظم رحم - گاهی اوقات همراه با سفتی پارامترها - مشاهده می‌گردد. تشخیص ممکن است توسط بیوپسی آندومتر تأیید شود ولی تشخیص قبل از عمل معمولاً لیومیوم است (۵). این تومورها براساس مورفولوژی سلولی، حاشیه تومور، تهاجم به عروق و لنفاتیک و همچنین تعداد میتوز به سه گروه تقسیم می‌شوند (۳-۱):

۱- ندول استروما (stromal nodule).

۲- سارکوم استرومای آندومتر با درجه پایین (low grade endometrial stromal sarcoma).

۳- سارکوم تمایز نیافته رحم با درجه بالا (high grade undifferentiated uterine sarcoma).

(I) استادیار آسیب‌شناسی، بیمارستان شهدای هفتم تیر، شهرری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران (*مؤلف مسؤول)

(II) رئیس بخش جراحی بیمارستان فیروزآبادی، بالاتر از میدان شهرری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.

(III) دستیار آسیب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.