

آدنوم سیرنگوماتوز نوک پستان: گزارش ۱ مورد

چکیده

در این گزارش خانم ۴۱ ساله‌ای معرفی می‌شود که به علت وجود توده‌ای سفت در زیر نوک پستان چپ تحت عمل بیوپسی اکسیزیونال قرار گرفته بود. در نمای ماکروسکوپی ضایعه، توده‌ای سفت با حدود نامنظم، به رنگ کرم - خاکستری و با اندازه $1/5 \times 1/5 \times 1/5$ سانتی‌متر قابل مشاهده بود. در معاینه ریز بینی نیز، توموری انفلتراتیو حاوی توبول‌های کوچک طنابی شکل و زاویه دار که به صورت تک تک در استرومای فیبروزه فراوان قرار گرفته بودند، مشاهده گردید. این مجاری توسط یک یا چند لایه سلول اپی‌تلیال پوشیده شده بودند و شکل‌های مشخص قطره اشکی، دم قورباغه‌ای و ویرگولی شکل داشتند. در نمای نزدیک‌تر، یک لایه مشخص از سلول‌های میوای‌تلیال بین سلول‌های اپی‌تلیال و استرومای فیبروز مشاهده شد که در اغلب مناطق، سلول‌های اپی‌تلیال، دارای تمایز سنگ‌فرشی و گاه همراه با تجمعات کراتین در داخل مجاری بودند. توبول‌ها در برخی از مناطق، رشته‌های عصبی را مورد تهاجم قرار داده بودند. در نهایت با توجه به یافته‌های ذکر شده برای بیمار تشخیص بسیار نادر آدنوم سیرنگوماتوز یا تومور خوش‌خیم نوک پستان که تا کنون تنها ۲۷ مورد از آن در مجلات انگلیسی زبان معرفی شده است مطرح گردید. با توجه به اطلاعات موجود، مورد اخیر، احتمالاً اولین مورد گزارش شده این آدنوم از ایران است.

*دکتر مهشید هورمزدی I

دکتر علی زارع‌میرزایی II

کلیدواژه‌ها: ۱- پستان ۲- نوک پستان ۳- آدنوم سیرنگوماتوز

مقدمه

آدنوم سیرنگوماتوز پستان با جای‌گزینی مشخص در زیر نوک پستان و آرئول شناخته می‌شود اما موارد عمقی آن نیز گزارش شده است (۲).

از نظر بافت شناسی این تومور انفلتراتیو نمای رشدی شبیه به تومورهای غدد عرق یا سیرنگوماها دارد. اهمیت ضایعه در تابلوی بالینی - آسیب‌شناسی آن بوده و در درجه اول، افتراق آن از کارسینوم پستان مطرح است.

در حال حاضر یافته‌ها در مورد این تومور و ماهیت آن محدود می‌باشد (۳).

آدنوم سیرنگوماتوز (Syringomatous adenoma) تومور خوش‌خیم و بسیار نادر نوک پستان است که برای اولین بار در سال ۱۹۸۳، ۵ مورد آن توسط روزن (Rosen) شرح داده شد (۱).

تاکنون تنها ۲۷ مورد از این بیماری در مجلات انگلیسی زبان گزارش شده است.

در گزارش روزن (Rosen) بجز یک مورد اولیه، سایر موارد (۲۶ مورد) در زنان رخ داده بود.

محدوده سنی بیماران بین ۱۱ تا ۷۶ سال و متوسط سنی آن‌ها حدود ۴۰ سال بوده است.

(I) استادیار گروه آسیب‌شناسی، بیمارستان شهدای هفتم تیر، شهرری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران (*مؤلف مسئول).

(II) دستیار آسیب‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.