

گزارش یک مورد تامپوناد قلبی به عنوان نخستین علامت میکسدم

چکیده

مقدمه: تامپوناد قلبی بندرت در بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی دیده می‌شود و در مقابل، پریکاردیال افیوژن در این زمینه، نسبتاً شایع است.

*دکتر میترا گل محمدی I

معرفی بیمار: بیمار یک خانم ۷۰ ساله مبتلا به تامپوناد قلبی بود که میکسدم به عنوان علت آن تشخیص داده شد. درمان شامل پریکاردیوستنز و تجویز لووتیروکسین به دنبال آن بود. علایم، بعد از مدت کوتاهی، از بین رفته و بیمار کاملاً بهبود یافت.

دکتر حمید مهدیزاده II

نتیجه‌گیری: تامپوناد قلبی به عنوان اولین علامت هیپوتیروئیدی، نادر می‌باشد و هنگام تشخیص تامپوناد قلبی، تنها با ظن قوی می‌توان آن را تشخیص داده و اقدام مناسب انجام داد.

کلیدواژه‌ها: ۱- پریکاردیال افیوژن ۲- میکسدم ۳- تامپوناد قلبی ۴- پریکاردیوستنز

تاریخ دریافت: ۸۴/۱۱/۲۳، تاریخ پذیرش: ۸۵/۶/۱۹

مقدمه

در بررسی‌های اولیه‌ای که در مورد شیوع پریکاردیال افیوژن همراه با هیپوتیروئیدی درمان نشده انجام شد، این میزان، ۷۸-۳۰٪ ذکر شده است.^(۱) در بررسی‌های دیگری که توسط سایر محققین انجام شده است، شیوع آن، ۳۰-۵٪ گزارش شده است.^(۲) با این وجود، اغلب گزارشات حاکی از نادر بودن تامپوناد قلبی در زمینه هیپوتیروئیدی است.^(۳) علل مختلفی می‌توانند باعث بروز تامپوناد قلبی شوند، تشخیص سریع و بموقع این علل، بسیار مهم می‌باشد، زیرا باعث بهتر شدن پیش‌آگهی و پیشگیری از اقدامات تهاجمی و غیرضروری می‌شود.

معرفی بیمار

بیمار، خانم ۷۰ ساله‌ای بود که به دلیل تنگی نفس شدید و ناگهانی، درد سینه، تعریق و بی‌حالی شدید در بیمارستان امام خمینی ارومیه پذیرفته شد. بیمار، خانم نسبتاً چاق (وزن بدن=۸۰ کیلوگرم) با صورت پف‌آلود و کاملاً بی‌حال بود که ارتباط درستی نیز برقرار نمی‌کرد.

در معاینات اولیه، فشار خون بیمار، ۱۲۰/۷۰ میلی‌متر جیوه همراه با نبض پارادوکس (کاهش فشار خون سیستولیک بیش از ۱۰ میلی‌متر جیوه در هنگام دم) به میزان ۲۰ میلی‌متر جیوه بود. تعداد ضربانات قلب، ۱۰۰ ضربه در دقیقه بود و

I) استادیار و فلوشیپ بیهوشی قلب، بیمارستان امام خمینی، بلوار ارشاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ارومیه، ارومیه، ایران (*مؤلف مسؤول).

II) استادیار و جراح قلب و عروق، بیمارستان امام خمینی، بلوار ارشاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ارومیه، ارومیه، ایران.