# بررسی فراوانی ۲۰ ساله تومورهای تخمدان در بیمارستان دکتر شریعتی و توزیع سنی آن‌ها

*دکتر مریم کاشانیان I
دکتر ناصر کمالیان II
دکتر کتایون افشارپاد III

**چکیده**

هدف از این مطالعه بررسی فراوانی انواع تومورهای تخمدان در یک دوره ۲۰ ساله در بیمارستان شریعتی تهران از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۷٤ و نیز بررسی توزیع سنی بیماران بوده است. این مطالعه به صورت گذشته‌نگر روی بیمارانی که در فاصله زمانی فروردین ماه ۱۳۵۵ تا اسفند ماه سال ۱۳۷٤ در بیمارستان شریعتی تشخیص آسیب‌شناسی آن‌ها نئوپلازی‌های تخمدان بود، صورت گرفت سپس فراوانی انواع تومورها و نیز توزیع سنی آن‌ها بررسی شد. از ٤۹۳ مورد نئوپلازی تخمدان بررسی شده، تومورهای اپی‌تلیالی سطحی با ۲۸۳ مورد(٥۷/٤٪ کل تومورها) بیش‌ترین تعداد را تشکیل می‌دادند. سایر موارد شامل ۱٥۲ مورد تومور ژرم سل(۳۰/۸۳٪) و ۳۱ مورد(٦/۲۸٪) تومور طناب جنسی و ۲٤ مورد تومور متاستاتیک(٤/۸٦٪ کل تومورها) بود. از ۳ مورد باقی‌مانده ۲ مورد لوتئوم و ۱ مورد کندروما بوده است. شایع‌ترین تومور خوش‌خیم تخمدان، کیست درموییدد(۳۹/٥۳٪) و پس از آن سروسیت آدنوما با ۲۹/۹٤٪ و موسینوس سیست آدنوما با ۱٤/۸۲٪ مشاهده شد. شایع‌ترین تومورهای بدخیم تخمدان تومورهای سروزی بدخیم بودند(٥۳/٦۹٪ تومورهای بدخیم) و متاستازها(۱٦/۱٪ تومورهای بدخیم) و موسینوس سیست آدنوکارسینوما(۱٤/۰۹٪ تومورهای بدخیم) در رده‌های بعدی قرار گرفته بودند. اغلب تومورها در این مطالعه، در رده سنی ۳۰-۲۱ سال مشاهده شدند(۱۱۱ نفر) و پس از آن ۹۹ نفر در رده سنی ٦۰-٥۱ سال و ۹٦ نفر در رده سنی ٤۰-۳۱ سال قرار داشتند. در این مطالعه، میزان تومورهای اپی‌تلیالی سطحی کم‌تر از مطالعات جهانی و ژرم سل توموها بیش از سایر مطالعات بوده است که شاید به علت جمعیت جوان‌تر بیماران این مطالعه باشد(اغلب تومورها در رده سنی ۳۰-۲۱ سال بودند) هم‌چنین متاستازها درصد بالاتری از تومورهای بدخیم را تشکیل می‌دادند(نسبت به سایر مطالعات) که می‌تواند نشان دهنده تشخیص دیرهنگام بدخیمی باشد. در گروه تومورهای طناب جنسی، بیش‌ترین تعداد را فیبروتکوما تشکیل می‌داد در حالی که در سایر مطالعات، تومورهای گرانولوزا تکاسل بیش‌ترین تعداد را داشتند که عوامل نژادی را نیز باید در نظر گرفت.

**کلیدواژه‌ها:** ۱ – تومورهای تخمدان ۲ – تومورهای خوش‌خیم تخمدان
۳ – تومورهای بدخیم تخمدان

**مقدمه**

تومورهای تخمدان به دلیل مرگ و میر بالای ناشی از آن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند و بیش‌ترین نسبت مرگ‌ومیر به ازای تعداد موارد مشاهده شده(Fatality to case ratio) را در بین تمام سرطان‌های دستگاه تناسلی دارا

---

این مقاله خلاصه‌ای است از پایان نامه دکتر کتایون افشارپاد جهت دریافت درجه دکترای عمومی به راهنمایی دکتر مریم کاشانیان و مشاوره دکتر ناصر کمالیان، سال ۱۳۷٥.

I) استادیار بیماری‌های زنان و زایمان، بیمارستان شهید اکبرآبادی، خیابان مولوی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران.(*مولف مسئول)
II) استاد گروه آسیب‌شناسی، بیمارستان دکتر شریعتی، بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران.
III) پزشک عمومی