

انسداد کاذب روده یا سندرم Ogilvie

چکیده

انسداد کاذب کولون یا سندرم Ogilvie ناشی از گشادی و اتساع فوق‌العاده زیاد روده است که گاهی منجر به پارگی شده عواقب مخاطره‌آمیزی را به دنبال دارد. تعریف انسداد کاذب عبارت است از حالتی که بیمار علائم انسداد روده را دارد بدون اینکه علت مکانیکی برای انسداد وجود داشته باشد. این حالت اغلب همراه بیماری‌های دیگر یا متعاقب اعمال جراحی مختلف از جمله جراحی‌های شکم دیده می‌شود. علل مساعدکننده، یک سری بیماری‌های داخلی و جراحی می‌باشند. بیماران مبتلا به نارسائی کلیه و بیمارانی که تحت پیوند کلیه قرار گرفته‌اند نیز از جمله بیماران مستعد ابتلا به سندرم Ogilvie می‌باشند. مورد معرفی نیز به علت نارسائی کلیه و سابقه پیوند کلیه دچار این سندرم شده بود. این بیمار در حالت پریتونیت ناشی از پارگی (پرفوراسیون) سکوم مورد تشخیص قرار گرفت و درمان شد. کاهش فشار (Derompression) کولون با کولونوسکوپ یک روش مناسب و موثر برای درمان این سندرم به حساب می‌آید. اگر بیمار دچار عوارضی مانند ایسکمی و در نتیجه پرفوراسیون شود ناگزیر احتیاج به دخالت جراحی خواهد داشت.

*دکتر رسول عزیزی I

دکتر شهریار علیزادگان II

۲- سندرم Ogilvie

۴- پرفوراسیون

۱- انسداد کاذب

۳- دیلاتاسیون کولون

کلید واژه‌ها:

مقدمه

تخصصی طب داخلی و جراحی لازم است. درمان به موقع آن با روش غیر جراحی و غیر تهاجمی با استفاده از کولونوسکوپ امکان‌پذیر می‌باشد و کمک شایان توجهی به بیمار می‌نماید. در صورت فقدان توجه و عدم تشخیص به موقع سبب پارگی (پرفوراسیون) روده و ایجاد عوارض خطرناک پریتونیت مدفوعی (Fecal) خواهد شد که درصد مرگومیر فراوانی دارد.

معرفی بیمار

مورد معرفی آقای ۴۰ ساله‌ای است اهل و ساکن تهران،

سندرم Ogilvie یا انسداد کاذب به حالتی اطلاق می‌گردد که بیمار علایم انسداد روده را از نظر کلینیکی دارا می‌باشد بدون اینکه علت مکانیکی و فیزیکی انسداد را داشته باشد. این حالت اغلب همراه با یک سری بیماری‌های داخلی مثل لوپوس و دیگر بیماری‌های بافت همبند، کم‌کاری تیروئیدی، نارسائی کلیه، بیماران پیوند کلیه، مسمومیت با سرب، عفونت‌ها و یا بیمارانی که اعمال جراحی مختلفی شده‌اند، از جمله جراحی شکم، ترومای شکم، سزارین و اعمال جراحی ارتوپدی دیده می‌شود.

آگاهی نسبت به این بیماری برای رشته‌های مختلف

(I) استادیار جراحی کولورکتال، بیمارستان فیروزگر، میدان ولیعصر، خیابان شهید ولدی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران (*مؤلف مسئول)

(II) دستیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.