

بالی شدن ارادی یا خود خواسته اسکاپولا

چکیده

*دکتر مجید عیوض ضیایی I

دکتر فرشاد شرفی II

بالی شدن ارادی یا Voluntary Winging ناهنجاری بسیار نادری است که هیچ گونه ضایعه عضوی در بیمار وجود ندارد و این پدیده یک مجموعه عضوی - روحی (Sycho-somatic) می باشد. در این مقاله ۳ بیمار مبتلا به بالی شدن ارادی اسکاپولا در محدوده سنی ۱۲ تا ۲۵ سال که در مدت ۸ سال به کلینیک شانه بیمارستان شفاپایان مراجعه کرده و تحت نظر و درمان قرار گرفته بودند گزارش می شوند.

کلیدواژه‌ها: ۱ - اسکاپولا ۲ - بالی شدن اسکاپولا ۳ - بالی شدن ارادی یا خود خواسته

مقدمه

بالی شدن اسکاپولا مترادف با فلج عضله سراتوس قدامی می باشد (۱). این ناهنجاری در سال ۱۸۲۵ توسط ولپو گزارش شد (۱ و ۲).

پدیده بالی شدن اسکاپولا یک اختلال معمول در مفصل اسکاپو لوتوراسیک است اما بالی شدن ارادی یا خود خواسته بسیار نادر می باشد.

در رابطه با این بیماری طبقه بندی های مختلفی از نظر علت یا آناتومی ارائه شده است. عده ای آن را به ۴ گونه عصبی - عضلانی، استخوانی، مفصلی و ارادی تقسیم می کنند و گروهی دیگر آن را به ۳

دسته استاتیک، دینامیک و ارادی طبقه بندی کرده اند.

در بالی شدن نوع دینامیک، در حالت معمولی شکل اسکاپولا عادی است اما با انقباض عضلات، اسکاپولا به حالت بالی در می آید.

در نوع ارادی نیز بیمار این حالت را دارد در حالی که در نوع استاتیک در تمام حالت ها بالی شدن با شدت های متفاوت وجود دارد.

(I) استادیار گروه ارتوپدی، بیمارستان شفاپایان، خیابان مجاهدین اسلام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران. (*مؤلف مسئول)

(II) دستیار ارتوپدی، بیمارستان شفاپایان، خیابان مجاهدین اسلام، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران، تهران.