

گزارش مورد

آنیزوکوریا یافته غیر معمول در حین جراحی آندوسکوپی سینوسی (گزارش یک مورد)

دکتر محمد حسین تازیکی^۱، دکتر سید حسن حسینی خواه^۱، دکتر کاظم کاظم نژاد^۲

۱- متخصص گوش و حلق و بینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان. ۲- متخصص بیهوشی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان.

چکیده

جراحی آندوسکوپی سینوس می‌تواند باعث عوارضی از جمله عوارض چشمی و مغزی شود. در صورت ایجاد عارضه چشمی یکی از علائم آن آنیزوکوریا می‌باشد. بیمار خانمی ۴۲ ساله بود که به علت پولیپوز وسیع بینی و سینوس‌های پاراناژال با بیهوشی عمومی تحت عمل جراحی آندوسکوپی سینوس قرار گرفت. حدود نیم ساعت بعد از شروع عمل متوجه بزرگی مردمک چشم چپ شدیم که به نور پاسخ زیادی نمی‌داد و آنیزوکوریا بعد از ۸-۱۰ ساعت به حالت عادی برگشت و علائم چشمی بیمار حدود ۸-۱۰ ساعت بعد از شروع عمل به حالت عادی برگشت. به علت فقدان علائم تروما به چشم، به نظر می‌رسد که انتشار مواد تزریقی عامل آن باشند. لذا در موارد جراحی چنانچه سایر علل ایجاد کننده رد شوند، می‌توان چنین عاملی به عنوان مولد آنیزوکوریا در نظر گرفت.

کلید واژه‌ها: آنیزوکوریا، جراحی آندوسکوپی سینوسی، آدرنالین، گزیلاکانین، بیهوشی عمومی

نویسنده مسؤول: دکتر محمد حسین تازیکی، پست الکترونیکی: hoseinta@yahoo.com

نشانی: گرگان، مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر، بخش جراحی، تلفن: ۴-۲۲۲۰۵۶۱-۰۱۷۱، نمابر: ۲۲۲۷۹۱۰

وصول مقاله: ۸۶/۱/۱۸، اصلاح نهایی: ۸۶/۱۰/۱۲، پذیرش مقاله: ۸۶/۱۰/۱۵