

عوامل مرتبط با اسهال پایدار در کودکان زیر ۵ سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی و خانه های بهداشت روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان گرگان و آق قلا

دکتر عبدالله عباسی^۱، دکتر محمدرضا یوسفی^۲

چکیده

اسهال به عنوان یکی از علل عمده مرگ در بین کودکان کشورهای در حال توسعه می باشد و نیمی از این مرگ ها ناشی از اسهال پایدار است. این پژوهش به منظور تعیین عوامل مرتبط با اسهال پایدار کودکان زیر ۵ سال مناطق روستایی، روی ۷۰۸ کودک مبتلا به اسهال حاد در سال ۱۳۷۷ در روستاهای شهرستان گرگان و به شیوه تحلیلی - مقطعی انجام شده است. برای انجام این پژوهش ابتدا با روش مصاحبه چهره به چهره و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر و استخراج بعضی از متغیرها از پرونده خانه بهداشت، برای کودک مبتلا به اسهال حاد پرسشنامه تکمیل گردید. سپس در مرحله دوم، بعد از ۱۴ روز از شروع اسهال حاد، به منزل مسکونی کودک مراجعه شد و پرسشنامه مرحله دوم تکمیل گردید. عوامل خطر آفرین مرتبط با افزایش پایداری اسهال حاد که با انجام این پژوهش شناخته شده اند شامل سن کودک مبتلا به اسهال حاد، قومیت کودک مبتلا، مدت زمان استفاده از شیرمادر، کلرینه بودن آب آشامیدنی و غذای مصرفی کودک در زمان اسهال حاد می باشد. نتیجه این پژوهش مشخص نموده است ۱۱ درصد موارد اسهال حاد کودکان مورد مطالعه شکل پایدار به خود گرفته اند، یعنی بیش از ۱۴ روز از شروع اسهال، ادامه داشته اند. بنابراین با کنترل برخی عوامل خطر آفرین مرتبط می توان میزان مرگ و میرهای ناشی از اسهال را کاهش داد.

واژه های کلیدی: اسهال پایدار، کودکان زیر ۵ سال، قومیت، شیرمادر، جنس کودک

۱- متقصدن بیماری های عفونی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان، نشانی: گرگان، اول پاره شهینکلا، دانشگاه علوم پزشکی گلستان (بنیاد فلسفی)، معاونت آموزشی دانشگاه،

تلفاکس: ۳۳۲۱۶۶۱ - ۱۷۱۰

۲- پزشک عمومی