

همانژیوم سرویکس و گزارش یک مورد آن

دکتر رامین آذرهوش^۱، دکتر سپیده بخشنده نصرت^۲

چکیده

همانژیومها توده‌های عروقی خوش خیم هستند که درحد فاصل مالفورماسیونهای هامارتومی و نئوپلاسمهای حقیقی قرار می‌گیرند. اکثر این تومورها در ناحیه سروگردن ظاهر می‌شوند و باقیمانده موارد در تنه و اندامها رشد می‌کنند. همانژیومها در دهانه رحم، نادر هستند. همانژیومهای سرویکس معمولاً بدون آزار بوده، به شکل توده قرمز تیره یا ارغوانی رنگ تظاهر می‌نمایند. موردی که در این گزارش معرفی می‌شود، یک تومور عروقی با تشخیص همانژیوم کاورنوس مربوط به اگزوسرویکس یک زن ۳۵ ساله‌ای است که تظاهر بالینی آن به شکل توده کوچک پولیپوئیدی با سابقه‌ای از خونرویه‌های متناوب بوده است. با وجودی که این ضایعات معمولاً در طی تکامل خود در نهایت دچار پسرفت و تحلیل می‌شوند، به لحاظ مشابهت ظاهری با ضایعات خوش خیم شایعتر در ناحیه سرویکس، بایستی در هنگام برداشت آنها نهایت دقت به عمل آید تا از خونریزیهای شدیدی که ممکن است متعاقب دستکاری نادرست پیش آید، ممانعت به عمل آورد.

واژه‌های کلیدی: همانژیوم، کاورنوس، سرویکس

۱- متخصص آسیب‌شناسی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان، نشانی: مرکز آموزشی - درمانی ۵ آذر گرگان، بخش آسیب‌شناسی و

آزمایشگاه بالینی، تلفن: ۰۱۷۱-۴۴۲۰۵۶۱-۴، E.mail: Raminazarhoush@yahoo.com

۲- متخصص زنان و زایمان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی گرگان