

رابطه باکتریوری بدون علامت و پره‌اکلامپسی

نرجس سادات برقی*^۱، دکتر الهام کاشانی^۲، محمدرضا ربیعی^۳

چکیده

مقدمه و هدف: باکتریوری بدون علامت از شایع‌ترین مشکلات مهم در طول بارداری است و می‌تواند اثرات نامطلوبی بر نتیجه حاملگی داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین باکتریوری بدون علامت و پره‌اکلامپسی انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع موردی - شاهدی در طی فروردین الی بهمن سال ۱۳۸۱ در مرکز آموزشی - درمانی دزیانی گرگان انجام شد. ۱۵۰ زن باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی با ۱۵۰ زن باردار سالم که از نظر سن و سابقه پره‌اکلامپسی و نوبت حاملگی با گروه مورد یکسان‌سازی شده بود، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه و چک لیست مربوطه تکمیل گردید و برای کلیه بیماران آزمایش‌های کشت و کامل ادرار انجام شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی تی و من‌ویتنی و مجذور کای صورت گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه زنان بارداری که عفونت ادراری داشتند خطر ابتلا به پره‌اکلامپسی ۳/۲ برابر زنان باردار بدون عفونت ادراری بود [OR= ۳/۲۲، CI درصد ۹۵ for OR : (۱/۹۹ و ۵/۲۱)]. نتیجه‌گیری: با توجه به این که ممکن است باکتریوری بدون علامت از عوامل مساعد کننده پره‌اکلامپسی باشد، بنابراین با غربالگری طی اولین ویزیت و تکرار آن در ترایمستر دوم و سوم بارداری و درمان آن می‌توان عوارض مادری و جنینی را کاهش داد.

واژه‌های کلیدی: باکتریوری بدون علامت، پره‌اکلامپسی

* ۱- کارشناس ارشد مامایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، نشانی: گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گرگان، مجتمع آموزشی انجیراب، دانشکده پرستاری و مامایی بویه، تلفن: ۰۱۷۱-۴۴۲۶۹۰۰، پست الکترونیک: parica33@yahoo.com

۲ - متخصص زنان و زایمان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

۳ - کارشناس ارشد آمار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان