

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مبتلایان به برونشیت ناشی از مواجهه شیمیایی

سید عباس تولایی^{۱*}، M.D.، شروین آثاری^{۲*}، M.D.، مهدی حبیبی^{۳*}، M.Sc.، مهدی عزیزآبادی فراهانی^{۴*}،
M.D.، یونس پناهی^{۵*}، Ph.D.، فرشید علاء الدینی^{۶*}، Ph.D.، مصطفی قانع^{۷*}، M.D. و
غلامرضا کرمی^{۸*}، M.D.

آدرس مکاتبه: *دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع» - پژوهشکده طب رزمی - مرکز تحقیقات علوم رفتاری - تهران - ایران

**دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع» - واحد تحقیقات بالینی دانشگاه - تهران - ایران

***دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع» - پژوهشکده طب رزمی - مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی - تهران - ایران

****پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان - تهران - ایران

تاریخ اعلام قبولی مقاله: ۱۳۸۵/۱/۳۱

تاریخ دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۸۵/۱/۲۰

تاریخ اعلام وصول: ۱۳۸۴/۱۱/۱۵

خلاصه

مقدمه: افت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در مبتلایان به برونشیت متعاقب پیوند ریه گزارش شده است. با این وجود، از کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مبتلایان به برونشیت ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی اطلاعات زیادی منتشر نشده است. مطالعه حاضر با هدف توصیف کیفیت زندگی مبتلایان به برونشیت ناشی از مواجهات شیمیایی و همچنین بررسی ارتباط آن با برخی متغیرها انجام شد.

مواد و روش کار: در مطالعه مشاهده‌ای - مقطعی حاضر، ۳۸۳ بیمار مبتلا به برونشیت ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی به صورت در دسترس از بین مراجعین به درمانگاه ریه بیمارستان بقیه... در سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ انتخاب شدند. از تمامی بیماران یک چک لیست شامل متغیرهای دموگرافیک و مرتبط با جانبازی تکمیل گردید. تمامی بیماران پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت سنت جورج (SGRQ) را نیز تکمیل کردند.

نتایج: میانگین (انحراف معیار) نمرات زیر مقیاس‌های علائم، فعالیت، تاثیر بیماری و نمره کلی پرسشنامه به ترتیب برابر (۱۶/۲۸) ۶۸/۰۷ (۱۹/۵۳) ۶۷/۳۸ (۲۱/۵۷) و ۴۷/۰۲ (۱۷/۴۲) ۵۶/۶۸ بود. ارتباط معنی‌دار آماری بین زیر مقیاس‌های پرسشنامه و شغل مشاهده شد ($p < 0/05$). ارتباط معنی‌دار آماری بین نمره کلی پرسشنامه و همچنین زیر مقیاس‌های علائم و تاثیر بیماری با سطح تحصیلات مشاهده شد ($p < 0/05$). ابتلای همزمان به بیماری‌های پوست، چشم، روانپزشکی، سابقه مصرف داروی روانپزشکی و سابقه بستری در بخش روانپزشکی با کیفیت زندگی نامطلوب‌تر همراه بود ($p < 0/05$). ارتباط معنی‌داری بین کیفیت زندگی و سن، فاصله زمانی بین مطالعه و مواجهه شیمیایی و درصد جانبازی مشاهده نشد ($P > 0/05$).

بحث: مطالعه حاضر، افت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت مبتلایان به برونشیت ناشی از مواجهات شیمیایی را نشان داد. براساس این مطالعه، این بیماران دچار علائم شدید ریوی می‌باشند و فعالیت ایشان دستخوش تغییرات قابل

۱- استادیار - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع» - نویسنده مسئول

۳- کارشناس - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع»

۵- استادیار - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع»

۷- استاد - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع»

۲- پزشک عمومی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع»

۴- پزشک عمومی - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع»

۶- استادیار - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع»

۸- استادیار - دانشگاه علوم پزشکی بقیه... «ع»