



تیغ ماهی سرگردان:

یک مورد آبسه لگنی به علت سوراخ شدگی رکتوم به دنبال بلع تصادفی تیغ ماهی

سیروس عباسی^{*}، سکینه اسدی^۱، کلثوم افراسیابی^۲، فرزاد مرادحاصلی^۳

^۱ بخش جراحی، بیمارستان سلمان فارسی بوشهر

^۲ مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای، پژوهشکده زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

^۳ مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی پزشکی، پژوهشکده زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

تیغ ماهی یکی از شایع‌ترین اجسام خارجی است که به‌طور تصادفی بلعیده می‌شود و می‌تواند موجب عوارضی مانند پارگی، انسداد و آبسه در دستگاه گوارش شود. بیمار مرد ۷۵ ساله‌ای است که به دنبال اختلال اجابت مزاج، یبوست و اسهال گهگاهی، از حدود ۳ ماه قبل و اخیراً تب و لرز مراجعه کرد. در معاینه بالینی تندرست خفیف در ناحیه هیپوگاستر و تندرست و تورم خفیف در جدار قدامی رکتوم و پروستات حین توشه رکتال مشهود بود. بررسی‌های انجام شده شامل سونوگرافی و سی‌تی‌اسکن شکم و لگن شواهدی به نفع وجود آبسه لگنی در فضای بین مثانه و رکتوم را نشان داد. بیمار بستری و بعد از انجام اقدامات لازم تحت لاپاراتومی قرار گرفت، چسبندگی گسترده و آبسه لگنی مشهود بود که تخلیه شد. یک تیغ ماهی به‌طول تقریبی ۶ سانتی‌متر از جدار کنار رکتوم آبسه خارج شد؛ شستشوی کامل شکم، درناژ خارجی حفره آبسه و انحراف مسیر روده انجام و شکم بسته شد. بعد از ۴ روز بیمار با حال عمومی خوب ترخیص گردید. هدف از معرفی این بیمار مرور دوباره اهمیت بلع تصادفی تیغ ماهی و عوارض ناشی از آن است و اینکه تیغ سرگردان ماهی را به عنوان یک تشخیص افتراقی در بیماران ارجاعی با درد شکم، خونریزی گوارشی و تب با علت نامعلوم در شهرهای ساحلی مدنظر داشته باشید.

واژگان کلیدی: آبسه لگنی، تیغ ماهی، سوراخ شدگی رکتوم، سی‌تی‌اسکن

دریافت مقاله: ۸۹/۱/۱۰ - پذیرش مقاله: ۸۹/۲/۴

* بخش جراحی، بیمارستان سلمان فارسی بوشهر، کدپستی: ۷۵۱۸۷-۵۹۴۱۶