

# بررسی عوامل خطرساز در ابتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه

\*دکتر کتایون خوشابی<sup>۱</sup>، دکتر آمنه ستاره فروزان<sup>۲</sup>، شهرام مرادی<sup>۳</sup>، دکتر پروانه محمدخانی<sup>۴</sup>

## چکیده

هدف: با توجه به اهمیت بالینی اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات رفتاری در کودکان و تأثیر آن در سیستم خانواده در پژوهش حاضر به بررسی عوامل خطرساز در ابتلا به این اختلال پرداخته می‌شود.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی مقایسه‌ای بوده و آزمودنی‌های پژوهش حاضر را ۱۹۲ کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس در یک دوره زمانی دو ساله (ابتدای سال ۸۲ تا انتهای سال ۸۳) به مرکز روانپژوهی اطفال ارجاع شده بودند و تشخیص اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه بر اساس معیارهای DSM-IV توسط دو روانپژوه کودک در آنها مسجل شده بود (گروه آزمایش) و ۲۱۰ کودک جامعه عادی که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی از مدارس و مهدهای کودک شهر تهران انتخاب شده و از لحاظ متغیرهای پژوهش با گروه آزمایش همتاسازی شده بودند (گروه کنترل)، تشکیل می‌دادند. داده‌های پژوهش با کمک روش‌های توصیفی مانند فراوانی و درصد و نیز استفاده از روش‌های آمار استنباطی نظری خی دو مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد میزان بروز این اختلال در پسران از دختران بیشتر است ( $P=0.0001$ ) و  $\chi^2=33/8$ . میزان بروز ADHD در فرزندان والدین دارای نسبت خویشاوندی از فرزندانی که والدین غیرخویشاوند دارند بیشتر است ( $P=0.03$  و  $\chi^2=4/95$ ). میزان بروز اختلال ADHD در کودکانی که سابقه ابتلا به اختلال بیش فعالی در والدین و بستگان آنها وجود دارد بیشتر از کودکانی است که سابقه ابتلا به اختلال بیش فعالی در والدین و بستگان آنها وجود ندارد ( $P=0.0001$  و  $\chi^2=26/88$ ). میزان بروز اختلال ADHD در کودکان والدینی که دارای سابقه بیماری‌های روانی می‌باشند بسیار بیشتر از کودکان والدینی است که سابقه بیماری‌های روانی ندارند ( $P=0.0001$  و  $\chi^2=9/83$ ). در نهایت میزان بروز اختلال ADHD در فرزندان اول و دوم بسیار بیشتر از فرزندان سوم و بالاتر است ( $P=0.0001$  و  $\chi^2=23/41$ ).

نتیجه‌گیری: پس بودن، ازدواج خویشاوندی، سابقه ابتلا به اختلال بیش فعالی در والدین و بستگان، سابقه بیماری‌های روانی در والدین و فرزند اول و دوم بودن از عوامل خطرساز مهم در بروز ADHD می‌باشد.

**کلیدواژه‌ها:** عوامل خطرساز / اختلال بیش فعالی - کمبود توجه / اختلالات رفتاری / روانپژوهی اطفال

- ۱- فلوشیپ روانپژوهی کودک و نوجوان، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ۲- روانپژوه، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ۳- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
- ۴- دکترای روانشناسی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۵/۳/۱  
تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۶/۶

\* آدرس نویسنده مسئول:  
تهران، اوین، بلوار دانشجو، بن بست کودکیان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانپژوهی  
تلفن: ۰۲۴۲۹۷۲۶

\* E-mail: kkhushabi@yahoo.com