

مقایسه حافظه کوتاه مدت بیماران مالتیپل اسکلروزیس با افراد طبیعی

* محبوبه پارسائیان^۱، دکتر عبدالرحمان نجل رحیم^۲، دکتر مسعود کریملو^۳، دکتر محمد مظفری^۴

چکیده

هدف: مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری سیستم عصبی مرکزی است. الگوی اصلی آسیب عصب روانشناختی در بیماران ام.اس با نقصهای حافظه و توجه مشخص می شود.

مشکل حافظه تقریباً در ۵۰ تا ۶۰ درصد افراد ام.اس اتفاق می افتد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عملکرد حافظه در بیماران ام.اس می باشد.

روش بررسی: در یک پژوهش تحلیلی مورد - شاهدهی ۴۰ بیمار مالتیپل اسکلروزیس، (۳۰ بیمار تشدید شونده - بهبود یابنده «نوع عود و فروکش» و ۱۰ بیمار نوع پیشرونده مزمن)، که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند با ۴۰ فرد طبیعی با استفاده از مقیاس حافظه لوریا - نبراسکا ارزیابی و مقایسه شدند.

یافته ها: همه بیماران ام.اس (بدون افسردگی شدید که با مقیاس افسردگی بک بررسی شدند) آسیب معنی داری در تمام متغیرهای حافظه (کلامی، غیرکلامی، تأخیری و عملکرد کلی حافظه) نسبت به گروه کنترل نشان دادند ($P < 0/001$). تفاوت عملکردهای حافظه در بین بیماران با دو نوع ام.اس معنی دار نبود ($P > 0/094$). علاوه بر این بین ضعف حافظه و آسیبهای ام.اس تفاوت معنی داری وجود نداشت ($P > 0/177$).

نتیجه گیری: بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس آسیب معناداری در حافظه کلامی، غیرکلامی، تأخیری و حافظه کلی نسبت به افراد سالم دارند و توجه به این امر جهت اتخاذ راهبردهای مؤثر توانبخشی بر اساس الگوهای آسیب حافظه آنان می تواند مؤثر باشد.

کلید واژه ها: حافظه / مالتیپل اسکلروزیس / عصب روانشناختی / سیستم عصبی مرکزی / لوریا-نبراسکا

- ۱- کارشناس ارشد گفتار درمانی
- ۲- متخصص مغز و اعصاب، استادیار
- ۳- دکترای آمار حیاتی، استادیار
- ۴- دکترای روانشناسی، استادیار
- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

تاریخ دریافت مقاله: ۸۴/۱۰/۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۵/۱/۲۰

*آدرس نویسنده مسئول:

تهران، بزرگراه بسیج، سه راه تختی،
شهرک فجر، بلوک ۴۳، واحد ۷.
تلفن: ۳۳۲۴۲۶۸۷

E-mail: mahparsa@yahoo.com