

تعیین منشأ و شاخص‌های آلودگی منابع آب و خاک و اثرات آن بر سیستم ایمنی جانداران، جنوب‌باخته بیجار، کردستان



احمد دادستان، کارشناس ارشد هیدرولوژی و تکتونیک، گروه زمین‌شناسی زیست‌محیطی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات
معدنی کشور، Email: kdadsetan@gmail.com
جلیل مهرزاد، فوق تخصص اینمولوژی، گروه پانوپیولوژی، دانشکده دامپردازی، دانشگاه فردوسی مشهد، mehrzad@um.ac.ir



چکیده:

منطقه جنوب‌باخته بیجار در استان کردستان، قسمتی از راستای شمال‌باخته‌ی-جنوب‌خاوری کمربرند آتشفشن‌های کواترنری در بخش شمالی پهنه ماغماهی- دگرگونی سنندج- سیرجان، منطبق با محور قروه- بیجار- تکاب، یک ایالت متالوزنی است که دو قرخه آتشفشن‌انی میوسن بالایی و پلئیستوسن را ثبت کرده است. وجود همزمان ماقماهی‌های اسیدی و بازی در فاز آخر، دو منشأ متفاوت و مستقل ماقما را نشان می‌دهد. این منطقه از نظر تکتونیکی، به‌دلیل کشش ناحیه‌ای دارای شکستگی‌هایی با راستای NW، NE و N است، که مجازی اصلی خروج ترکیبات آرسنیک‌دار و دیگر عناصر جزئی با منشأ ژئوژئیک است که در تراوتن‌ها، بازالت‌های روزنگی‌دار و مارن‌های پلیوسن تجمع یافته‌اند. شاخص آلودگی (CIP) خاک‌های سطحی منطقه به سه دسته بدون آلودگی، آلودگی ضعیف و آلودگی متواتر تا خیلی شدید توسط عناصر سمی قابل تقسیم است. این آلودگی‌های با منشاء ژئوژئیک می‌توانند خطرات فراوانی برای سلامتی انسان و حیوانات داشته باشند. در مطالعه حاضر نمونه‌های آب و خاک منطقه مورد مطالعه و ادرار و موی انسانها و ادرار و پشم گوسفندان منطقه از نظر فلزات سنگین مخصوصاً آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت. شاخص فلزی (MI) در منابع آب جنوب‌باخته بیجار نشان می‌دهد که همه نمونه‌های آب دارای فلزات سنگین هستند و در دسته غیر قابل شرب طبقه‌بندی می‌شوند. شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) بر مبنای استانداردهای آب شرب WHO و EPA به ترتیب در 50 و 71 درصد منابع آب منطقه بر سلامت انسانها اثرات مخرب دارد، در حالی‌که با استاندارد آب شرب ایران تنها 21 درصد از سلامتی انسانها به خطر می‌افتد. با توجه به اینکه تمرکز اولیه مطالعه روی آرسنیک بوده، اندازه گیری‌های بیولوژیک از انسان و گوسفندان منطقه نشان می‌دهد که غلظت این عنصر سمی در بدن این موجودات بسیار بالا است. بر اساس نتایج اولیه آنالیزها، تأثیر آرسنیک به عنوان یکی از کلیدی‌ترین قسمت‌های سیستم ایمنی ذاتی گوسفند، نشان داد که آرسنیک قدرت میکروب کشی لکوسیت‌های خون را کاهش می‌دهد. برای شناسایی و تفکیک پهنه‌های نایپوسته و پراکندگی زمین‌های با آلودگی‌های ژئوژئیک در راستای محور قروه- بیجار- تکاب، بررسی‌های بزرگ مقیاس برای تهیه نقشه‌های کاربردی پهنه‌های آلوده و برای تعیین جایگاه و ارائه مدل تکتونیکی با بررسی‌های زمین‌شناسی ساختمانی پیشنهاد می‌شود. همچنین بررسی‌های سلولی- مولکولی بیشتری بر روی اثرات آرسنیک در سیستم ایمنی حیوانات و انسان‌های منطقه در آزمایشگاه‌ها توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: بیجار، آتشفشن کواترنری، آرسنیک ژئوژئیک، شاخص فلزی، شاخص آلودگی فلزات سنگین، سیستم ایمنی

Determination of source and indices of metal pollution in water and soil and their effects on animal and human immune system, SW Bijar, Kurdistan

Abstract:

The SW Bijar area in Kurdistan province is part of NE-SE trend of quaternary volcanoes belt at the northern Sanandaj- Sirjan magmatic-metamorphic zone, horizontally positioned on Ghorveh- Bijar- Takab, is the metallogenic province, at which two cycles of volcanic activities in the upper Miocene and Pleistocene have been recorded. Contemporary existence of basic and acidic magmas at the last phase shows two independently different sources. Due to regional tensional tectonics, this area contains network of fractures towards NW, NE and N trends that forms a way and channels for arsenic and other geogenic toxic chemical compounds to appear in water resources and soil; this kind of geogenic source normally accumulates in travertines, porous basaltic rocks and Pliocene marls. Based on the toxic elements, coefficient of industrial pollution (CIP) of topsoils in the area is divided into three groups: non-contamination, weak contamination and medium to very strong contamination.