

همه گیری شناسی اختلال های روان پزشکی در استان قزوین (۱۳۸۰)

دکتر محمدرضا محمدی* سیدعباس باقری یزدی** مهدی رهگذر*** دکتر بیتا مسگریپور**** دکتر محسن روشن پژوه*****
دکتر آنا باقری تبریزی*****

An epidemiological study of psychiatric disorders in Qazvin province (2001)

Mr.Mohammadi SA.Bagheri Yazdi M.Rahgozar B.Mesgarpour M.Roushan Pajouh
A.Bagheri Tabrizi

*Abstract

Background: Planning for providing essential mental health services to the people requires a comprehensive understanding of the present status of psychiatric disorders in the society.

Objective: To carry out the epidemiological study of the psychiatric disorders among the individuals within the age group of 18 years and above in urban and rural areas of Qazvin.

Methods: This study was a cross-sectional survey in the year 2001. 354 individuals were selected through randomized systematic and clustered sampling methods from among the existing families of Qazvin province. The Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS) questionnaires were completed by a clinical psychologist. The diagnosis of the disorders was based on DSM-IV classification criteria.

Findings: The results of the study showed that the prevalence of psychiatric disorders in the province is 31.61% with a value of 42.23% for women and 20.66% for men. The anxiety and mood disorders with 20.89 and 4.80% respectively, showed a higher prevalence in the province. The prevalence of psychotic disorders in this study was 1.12%, neuro-cognitive disorders 2.54% and dissociative disorders 2.26%. In the group of mood disorders, major depression with 2.82% and in the group of anxiety disorders, phobia with 8.19 % showed a higher prevalence.

Conclusion: The findings make the responsibility of the health policy makers and programmers, in the fields of prevention, treatment and medical education more than before in relation to preparing both executive and practical plans in Qazvin province for mental health.

Keywords: Mental Disorders, Epidemiology, Psychology, Mental Health, Depression, Affective Disorders and Psychotic, Schizophrenia

*چکیده

زمینه: برنامه ریزی برای ارائه خدمات اساسی بهداشت روان به افراد، نیازمند آگاهی از وضعیت موجود بیماری روانی در جامعه است که با استفاده از پرسش نامه های غربال گری و مصاحبه بالینی ساختاریافته قابل شناسایی است.

هدف: مطالعه به منظور بررسی همه گیری شناسی اختلال های روانی در افراد بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی استان قزوین انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۸۰ از طریق تکمیل پرسش نامه اختلال های عاطفی و اسکیزوفرنیا (SADS) توسط کارشناسان روان شناسی در استان قزوین انجام شد. افراد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سیستماتیک از بین خانوارهای استان انتخاب و در مجموع ۳۵۴ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص اختلال ها بر اساس معیارهای طبقه بندی DSM-IV بود.

یافته ها: شیوع انواع اختلال های روان پزشکی در استان ۳۱/۶٪ بود که این شیوع در زنان ۴۲/۲٪ و در مردان ۲۰/۷٪ بود. اختلال های اضطرابی و خلقی به ترتیب با ۲۰/۹٪ و ۴/۸٪ شایع ترین اختلال های روان پزشکی در استان بودند. شیوع اختلال های روان پزشکی در این مطالعه ۱/۱٪، اختلال های عصبی- شناختی ۲/۵٪ و اختلال های تجزیه ای ۲/۳٪ بود. در گروه اختلال های خلقی، افسردگی اساسی با ۲/۸٪ و در گروه اختلال های اضطرابی، اختلال فوبی با ۸/۲٪ شیوع بیش تری داشتند. در این مطالعه ۱۷/۲٪ افراد مورد مطالعه دچار حداقل یک اختلال روان پزشکی بودند.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق مسؤولیت سیاست گذاران و برنامه ریزان بهداشتی استان قزوین و کشور را در رابطه با تدوین برنامه های عملی و اجرایی بهداشت روان بیش از پیش روشن می سازد.

کلید واژه ها: اختلال های روانی، همه گیری شناسی، روان شناسی، بهداشت روانی، افسردگی، اختلال های عاطفی و روان پریشی، اسکیزوفرنی

* استاد روان پزشکی کودک و نوجوان دانشگاه علوم پزشکی تهران

** کارشناس ارشد روان شناسی بالینی اداره سلامت روان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

*** مربی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی **** محقق مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

***** پزشک عمومی سازمان بهزیستی استان قزوین ***** روان پزشک

آدرس مکاتبه: تهران، خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از چهارراه لشکر، بیمارستان روزبه، تلفن ۵۴۱۲۲۲۲

Email: MOHAMMDN@SiNA.TUMS.AC.IR