

بررسی شیوع حاملگی های ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در مناطق روستایی شهرستان نجف آباد

فرشته زمانی^۱، دکتر نصرآ... بشردوست^۲، زهره رجبی^۳

خلاصه

سابقه و هدف: با توجه به شیوع حاملگی های ناخواسته، عوارض شناخته شده آن، تناقضات در مورد رفتار و عوامل مخاطره آمیز و عدم اطلاع از وضعیت آن در مناطق آسیب پذیر روستایی، این تحقیق به منظور تعیین شیوع و عوامل مربوط به حاملگی های ناخواسته در مناطق روستایی نجف آباد در سال ۱۳۷۶ انجام شد.

مواد و روش ها: تحقیق به روش مقطعی (Cross Sectional) روی تعداد ۷۸۸ نفر زنان باردار تحت پوشش خانه های بهداشت انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفی انتخاب و حاملگی ناخواسته بنا به اظهار زوجین تعیین و نقش نوع وسیله پیشگیری، سن در معرض خطر، نحوه مراجعه به خانه های بهداشت، محل دریافت تنظیم خانواده، میزان آگاهی از روشهای تنظیم خانواده، تمایل به سقط، سابقه حاملگی های ناخواسته و سایر عوامل مرتبط، بررسی و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد قضاوت قرار گرفت.

یافته ها: از ۷۸۸ خانم باردار مورد بررسی ۴۲ درصد حاملگی ناخواسته داشتند که محل دریافت خدمات تنظیم خانواده، نحوه استفاده از روشهای منقطع و فرصهای خوراکی در بروز حاملگی های ناخواسته شان نقش داشت، به طوری که خانمهای دارای حاملگی خواسته ۱۱/۲ درصد از روش منقطع و خانمهای دارای حاملگی ناخواسته ۲۵/۴ درصد از این روش استفاده کرده بودند.

نتیجه گیری و توصیه ها: میزان حاملگی ناخواسته بسیار بالا و خطرناک است. با توجه به عوارض شناخته شده این نوع حاملگی ها، بررسی دقیق علل و تحقیقات مداخله ای برای کاهش آن توصیه می گردد.

واژگان کلیدی: حاملگی خواسته، رفتار پرخطر در حاملگی ناخواسته، روشهای پیشگیری از حاملگی

تاریخ دریافت مقاله: ۸۲/۳/۴

تاریخ تایید مقاله: ۸۲/۵/۹

۱- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشکده بهداشت

۲- عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه آمار

۳- کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

• پاسخگو: زهره رجبی

✉ کاشان، خ اباذر، کوچه عترت ۲۶، مرکز آموزش بهورزی طالبیان

مقدمه

سلامت جامعه، مساله حاملگی های پرخطر شامل حاملگی در سنین زیر ۱۸ سال و بالای ۳۵ سال و حاملگی های با فاصله کم و پر تعداد می باشد. علاوه بر این ناخواسته بودن حاملگی، زنان را در معرض خطر بیشتری قرار می دهد، چرا که تعداد زیادی از زنان

همه ساله بروز بارداریهای ناخواسته ناشی از عدم استفاده صحیح از وسایل پیشگیری، در سراسر دنیا منجر به حدود ۱۴۹۰۰۰ مورد مرگ می شود (۱). یکی از نگرانی های فعلی در