

ارزیابی و مقایسه نمایان شدن لبه انسیزال در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حبیب حاجی میرآقا* - دکتر فرنوش فلاچزاده** - دکتر علی طبیبی***

*- استادیار گروه آموزشی پروتزهای ثابت دندانی دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

**- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

***- ارتو دنتیست.

چکیده

زمینه و هدف: دندانهای ثنایای میانی در ایجاد زیبایی، تکلم صحیح و کسب رضایت بیمار اهمیت دارند. به همین منظور این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه میزان نمایان شدن لبه انسیزال (*Incisal Edge Exposure IEE*) دندانهای ثنایای میانی بالا و پایین بر حسب سن و جنس در حالت استراحت انجام و در این زمینه فرمولهای راهبردی برای دندانپزشکان تعیین گردید.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، صد و بیست بیمار مرد و زن مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال دوم ۸۱-۸۲، که در گروهه سنی ۲۰-۴۶ سال قرار داشتند و فاقد لب تروماتیزه، تحملیل لشه، بیماری لشه یا پریودنتال، سایش پاتولوژیک در دندانهای قدامی، لقی، اکسیتروژن یا پرتوز در دندانهای قدامی بودند به صورت تصادفی انتخاب شده و بعد از تعیین سن، جنس و کلاس اکلوژن (براساس طبقه‌بندی انگل و رابطه مولری) در آنها، میزان نمایان شدن دندانهای ثنایای میانی بالا و پایین (*IEE*)، طول تاج کلینیکی (*Ig*) در دندانهای ثنایای میانی بالا و پایین و همچنین ارتفاع لب بالا (*LL*) در حالت استراحت با استفاده از یک خطکش فلزی کوچک اندازه‌گیری شد. بعد از جمع‌آوری داده‌ها، میزان *Ig* و *LL* به تفکیک جنس (آزمون *t*) و سن و همچنین رابطه *IEE* و *Ig* با طول لب بالا (*LL*) (آنالیز *Fischer*) تعیین شد.

یافته‌ها: میانگین *Ig* در دندانهای ثنایای میانی بالا و پایین در مردان بیشتر از زنان بود که این اختلاف طول در دندانهای ثنایای میانی پایین معنی‌دار نبود. میانگین *IEE* در مردان بیشتر از زنان بود که البته این اختلاف در دندانهای ثنایای میانی پایین معنی‌دار نبود. میانگین طول لب در مردان ۰/۰۷ میلی‌متر بیشتر از میانگین طول لب در زنان (۰/۲۱ میلی‌متر) بود. با افزایش سن، میزان نمایان شدن لبه انسیزال در دندانهای ثنایای میانی بالا کاهش و میزان نمایان شدن در دندانهای ثنایای میانی پایین افزایش می‌یابد که این افزایش *IEE* در دندانهای ثنایای میانی پائین با افزایش سن معنی‌دار نبود. در این مطالعه روابطی بدست آمد که با توجه به طول لب (*LL*), میزان نمایان شدن لبه انسیزال در دندانهای ثنایای میانی بالا و طول تاج کلینیکی دندانهای ثنایای میانی بالا را می‌توان بررسی کرد.
IEELU=0/۱۵۹ LL+0/۱۸۰ Ig

نتیجه‌گیری: با توجه به عوامل مختلفی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج حاصله می‌تواند در جامعه ایرانی، دندانپزشک را یاری دهد تا با توجه به جنس، سن و طول لب بالای بیمار طرح ایده‌آل و مناسبی را از لحاظ میزان نمایان بودن لبه انسیزال دندانهای ثنایای میانی بالا و پایین جهت نیل به حد اکثر زیبایی ارائه دهد.

کلید واژه‌ها: لبه انسیزال - ثنایای میانی - طول تاج کلینیکی - طول لب بالا - سن - جنس

وصول مقاله: ۱۳۸۵/۴/۱ پذیرش مقاله: ۱۳۸۵/۱۰/۹ اصلاح نهایی: ۱۳۸۵/۸/۳۰

نویسنده مسئول: گروه آموزشی پروتزهای ثابت دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران e-mail:H.Miragha@yahoo.com

مقدمه

جهت ارزیابی، تشخیص و برطرف کردن مشکلات زیبایی نیاز به یک سری روشهای مشخص، منظم و حساب شده

یک لبخند جذاب همیشه مرکز توجه اشخاص جهت بهبود زیبایی و ایجاد اعتماد به نفس می‌باشد.(۱)