

## بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر تهران نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندانها در کودکان (۱۳۸۲)

دکتر بهمن سراج\* - دکتر مهدی شهرابی\* - دکتر مریم بیژنی\*\* - علی اصغر حائری مهریزی\*\*\*  
 \* - استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.  
 \*\* - دندانپزشک.  
 \*\*\* - کارشناس ارشد آمار.

### چکیده

زمینه و هدف: معمولاً، صدمات ناشی از ضربه به دندانها تجربیات ناخوشایندی را برای کودکان فراهم می‌سازد و لازم است در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرند. هدف از این مطالعه ارزیابی آگاهی دندانپزشکان عمومی شاغل در شهر تهران نسبت به درمان این گونه صدمات است.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی پس از مشاوره آماری ۱۶۵ دندانپزشک عمومی دارای مطب در تهران انتخاب شده و پرسشنامه تنظیمی در اختیارشان قرار گرفت. بعد از کامل شدن پرسشنامه‌ها، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۱/۵ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. آزمونهای آماری به کار گرفته شده شامل آزمون ناپارامتری Mann-whitney U، ناپارامتری Kruskal-wallis، آزمون t و ضریب همبستگی Pearson می‌باشد.

یافته‌ها: آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر تهران در مورد صدمات ناشی از ضربه به دندانهای کودکان ۶۴٪ بوده است که میزان آگاهی دندانپزشکان با سن آنها رابطه معکوس داشت ( $P < 0/05$ ). علاوه بر آن میزان آگاهی دندانپزشکان با سال فارغ‌التحصیلی آنها رابطه مستقیم داشت ( $P < 0/05$ ).

نتیجه‌گیری: دندانپزشکان عمومی شهر تهران از نظر آگاهی در زمینه صدمات دندانی در کودکان در سطح نسبتاً مناسبی قرار دارند. با این حال ضروری است تدابیر لازم برای بهبود هر چه بیشتر آن صورت پذیرد.

کلید واژه‌ها: کودکان - صدمات دندانی - آگاهی - دندانپزشکان عمومی

پذیرش مقاله: ۱۳۸۶/۹/۲۲

اصلاح نهایی: ۱۳۸۶/۸/۲۶

وصول مقاله: ۱۳۸۵/۹/۱۹

نویسنده مسئول: گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران e.mail:mahdish99@yahoo.com

### مقدمه

تماسهای پروگزیمالی و انسیزالی دندانها وجود دارد، بنابراین هر دندانپزشک لازم است آمادگی مواجه شدن با چنین صدماتی را که خود از متنوعترین موارد اورژانس‌های دندانپزشکی می‌باشند، داشته باشد تا با تصمیم‌گیری درست بتواند با مهارت و اعتماد به نفس بیشتری اقدام نماید. (۷)، اطلاعات کافی دندانپزشک درباره صدمات دندانی و نحوه درمان آن می‌تواند به مقدار زیادی فشار روحی و نگرانی بیماران را نیز کاهش دهد. (۸)، انجمن بین‌المللی صدمات دندانی گزارش داده است که از هر دو کودک در سنین ۸-۱۲ سال یکی دچار صدمات دندانی می‌شود. آنها عقیده دارند که

بررسیهای مختلف نشان می‌دهند که وقوع صدمات دندانی در کودکان در سالیان اخیر افزایش یافته است. (۱-۴) دندانپزشکانی که در این خصوص مورد مشورت قرار گرفته و در جستجوی راه درمانی پس از ضربه می‌باشند، موظف به درمان بیمار از تمام روشهای ممکن بوده و یا باید سریعاً بیمار را به یک متخصص معرفی نمایند. (۵)، میزان آگاهی و مهارت دندانپزشکان عمومی که نتیجه تعلیمات و آموزشهایی است که دریافت کرده‌اند، نقش تعیین کننده‌ای در اداره صدمات دندانی وارده به کودکان دارد. (۶)، در مدت کوتاهی پس از ضربه احتمال بروز مالاکلوژن به علت از بین رفتن