

بررسی آنومالی های دندانی در کودکان مبتلا به شکاف لب و کام مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۷۹

دکتر بهجت الملوک عجمی* - دکتر مریم طالبی**

*- دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

** - استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

چکیده

زمینه و هدف: تولد یک نوزاد با ناهنجاری شکاف کام و لب معمولاً احساس نگرانی شدیدی برای والدین به همراه دارد. این بیماران عموماً دارای آنومالی های اکلوزنی و دندانی هستند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آنومالی های دندانی در بیماران مبتلا به شکاف بوده است.

روش بررسی: در این مطالعه Case Series چهار بیمار مبتلا به شکاف کام و لب در محدوده سنی ۱/۵-۲۱ سال مورد مطالعه قرار گرفتند. آمارگیری در طی مدت شش ماه در شهر مشهد صورت گرفت. با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها پردازش شد و فاصله اطمینان ۹۵٪ برای هر یک از انواع آنومالی محاسبه گردید.

یافته ها: در بین آنومالی ها بیشترین موارد مربوط به فقدان مادرزادی دندان لترال معادل ۲۴/۷٪ و چرخش انسيزورهای قدامی بالا برابر ۲۴/۷٪ موارد و کمترین یافته وجود دندان لترال اضافه ۱٪ در سمت شکاف بوده است.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه شکافها در بین تقایص ساختمانی مادرزادی شیوع بالائی را نشان می دهند و درمانهای پیچیده ای را می طلبند، لذا آموزش والدین و بیماران، وعده های منظم ملاقات با دندانپزشک و پزشک می تواند در کاهش عوارض ضایعه بسیار موثر باشد.

کلید واژه ها: شکاف کام - آنومالی دندانی - شکاف لب

پذیرش مقاله: ۸۳/۱۱/۱

اصلاح نهایی: ۸۳/۹/۲۲

وصول مقاله: ۸۳/۵/۲۲

نویسنده مسئول: گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد bh_ajami@yahoo.com

مقدمه

می باشند و پوسیدگی نیز در آنها شایع است. شکاف یکی از متداولترین نقایص مادرزادی عمده در انسان است، در سفیدپوستان شکاف کام همراه با شکاف لب شیوعی معادل یک در هر هفتصد تا هزار تولد دارد. در نژاد سیاه پوست بسیار کم و شیوعی معادل ۰/۴ در هر هزار تولد دارد. تقریباً ۸۰٪ موارد شکاف لب یک طرفه است و ۲۰٪ دو طرفه می باشد. شکاف کامل لب به داخل سوراخ بینی گسترش می یابد و آلوئول را درگیر می کند و پدیده ناپیدا در این موارد در مورد

شکاف کام و لب تاریخچه ای دیرینه دارند، از زمانهای قدیم تلاشهای فراوانی جهت ترمیم یا حل مشکلات بیماران مبتلا صورت گرفته است. تولد یک نوزاد با این ناهنجاری معمولاً با احساس نگرانی شدیدی برای والدین آنها همراه است. وظیفه مهم پزشکان و دندانپزشکان مجرب است که آمادگی و اطلاع لازم را داشته باشند تا بتوانند به نحو ی آنها را راهنمایی نمایند. این بیماران علاوه بر شکاف در ناحیه کام و لب مشکلات دیگری از جمله آنومالی اکلوزنی و دندانی دارا