

کبودی خود به خودی دو طرفه دور چشم در یک خانم حامله

غلامحسین یعقوبی^۱ - بهروز حیدری^۲ - محمدعلی یعقوبی^۳

چکیده

کبودی دور چشم به دنبال علل ضربه‌ای به ناحیه سر و گردن و علل غیر ضربه‌ای دیده می‌شود. در این مقاله یک مورد خود به خودی کبودی دور چشم غیرضربه‌ای دو طرفه در خانمی ۲۴ ساله در ماه هشتم حاملگی گزارش شده است. این بیمار ۱۲ ساعت پس از استفراغ، متوجه کبودی دور چشمانش شد که این کبودی به صورت دو طرفه با برتری در چشم راست بود. بیمار سابقه تروما و عمل جراحی قبلی سر و گردن را ذکر نمی‌کرد. حدت بینایی، معاینات چشمی، فشار خون و آزمایش ادرار بیمار طبیعی بود. این کبودی، ۲۰ روز بعد از مراجعه اول بیمار، کاملاً رفع شد و بیمار پس از گذشت شش ماه مشکلی نداشت. علل عمومی و موضعی زیادی برای ایجاد خونریزی دور چشم وجود دارد ولی علت بروز خود به خودی کبودی دور چشم در بیمار حامله‌ای که شواهد بیماری پره‌اکلامپسی را ندارد، ناشناخته است.

واژه‌های کلیدی: کبودی دور چشم، حاملگی، تهوع و استفراغ

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. ۱۳۸۸؛ ۱۶(۴): ۶۵-۶۸

دریافت: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ اصلاح نهایی: ۱۳۸۸/۸/۱۷ پذیرش: ۱۳۸۸/۸/۲۷

^۱ نویسنده مسؤول؛ متخصص چشم پزشکی و فلوشیپ شبکه و زجاجیه؛ دانشیار گروه آموزشی چشم‌پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آدرس: بیرجند- خیابان غفاری- بیمارستان ولی عصر (عج)- بخش چشم

تلفن: ۰۵۶۱-۴۴۴۳۰۰۱-۶ نمابر: ۰۵۶۱-۴۴۴۲۰۸۸ پست الکترونیکی: yaqubig@yahoo.com

^۲ عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

^۳ دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد