

شیوع عوارض بعد از بیهوشی در بیمارستان‌های

فاطمی و علوی اردبیل، ۱۳۷۹

دکتر مسعود انتظاری اصل^۱، دکتر محمد رضا قدرتی^۲، دکتر حمید عبادی زارع^۳، دکتر خاطره عیسی زاده فر^۴

چکیده

زمینه و هدف: مرحله ریکاوری بیهوشی یکی از پرخطرترین مراحل بیهوشی بوده و عوارض مختلف تنفسی، قلبی - عروقی، تهوع و استفراغ، لرز، درد و بی قراری با شیوع نسبتاً بالایی در آن گزارش شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع این عوارض در میان بیماران جراحی شده در اتاقهای عمل بیمارستانهای فاطمی و علوی اردبیل و شناسایی عوامل خطر ساز احتمالی دخیل در افزایش بروز این عوارض بوده است.

روش کار: در این مطالعه توصیفی، مقطعی ۱۶۰ بیمار کاندید عمل جراحی در بیمارستانهای فاطمی و علوی در زمستان ۱۳۷۹ انتخاب و پرسشنامه‌های مربوط به سوابق بیماری زمینهای، بیهوشی قبلی، سابقه اعتیاد، سابقه مصرف دارو، مصرف سیگار، کلاس فیزیکی ASA، نوع بیهوشی، زمان عمل و محل عمل جراحی در مورد آنها تکمیل و از نظر بروز عوارض بعد از بیهوشی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل از این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس بررسیهای انجام گرفته شیورینگ در ۳/۳۶٪، درد در ۹/۲۶٪، بیقراری در ۳/۲۱٪، عوارض ریوی در ۸/۱۳٪، عوارض قلبی-عروقی در ۱۲٪ و تهوع و استفراغ در ۸/۸٪ بیماران بعد از عمل جراحی مشاهده شد. همچنین در ارتباط با تأثیر برخی فاکتورها بر شیوع عوارض، ارتباط معنی داری بین شیورینگ و سابقه بیماری، سابقه مصرف دارو و محل عمل جراحی مشاهده شد. همچنین درد، بیقراری و عوارض ریوی با محل عمل جراحی رابطه معنی داری داشتند.

نتیجه گیری: برخی عوارض بعد از بیهوشی از جمله شیورینگ، درد و بیقراری بعد از عمل نسبت به مطالعات مشابه از شیوع نسبتاً بالاتری در میان بیماران مطالعه شده برخوردار بوده‌اند.

واژه‌های کلیدی: عوارض بعد از بیهوشی، عوامل خطر ساز بیهوشی، بیهوشی عمومی، درد پس از عمل

۱ - (مؤلف مسئول): استاد یار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲ - استاد یار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳ - متخصص بیهوشی

۴ - پزشک عمومی