

گزارش یک مورد پارا پلژی بدنبال لا پاراتومی

دکتر ایرج لطفی نیا^۱، دکتر مسعود نیازی غازانی^۲، دکتر شهنام بابلی^۳، معروف انصاری^۴

چکیده

پارا پلژی بر اثر عوامل مختلفی از قبیل پارگی و یا ترمیم جراحی آنوریسم آئورت، پارگی و یا ترومبوز آئورت، دیسکسیون آئورت، آمبولی شریان نخاعی قدامی، اختلالات انعقادی و بیماری لوپوس که همگی باعث اختلال جریان خون نخاع و ایسکمی نخاع می شوند بوجود می آید. هیپوتانسیون نیز ممکن است سبب انفارکتوس نخاع گردد. ولی در بررسی مدلاین و گزارشات موجود وقوع انفارکتوس نخاع در بیمارانی که به عللی غیر از ضایعات آئورت لا پاراتومی شده بودند بسیار نادر می باشد. در این مقاله بیمار گزارش شده بدنبال خونریزی داخلی و دو بار لا پاراتومی در نتیجه هیپوتانسیون طولانی مدت دچار انفارکتوس نخاع و پاراپلژی گردیده است. با توجه به سن، شغل و سلامت جسمانی که بیمار گزارش شده از آن برخوردار بود، احتمال ضایعات قلبی - عروقی و در نتیجه ترومبوآمبولی بسیار بعید بود. در ضمن با توجه به دو عمل انجام گرفته و فاصله زمانی بین دو عمل در این بیمار، تنها عامل ایجاد کننده قابل طرح هیپوتانسیون طولانی مدت می باشد که سبب ایسکمی و انفارکتوس نخاع گردیده است.

واژه های کلیدی: پارا پلژی، لا پاراتومی، هیپوتانسیون

۱- مؤلف مسئول: استاد یار جراحی مغز و اعصاب دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲- استاد یار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳- رزیدنت جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴- کارشناس هوشبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز