

بررسی علل دیفکت های اسکالپ و نتایج بازسازی بر حسب نوع ضایعه در بیماران عمل شده در بیمارستان ۱۵ خرداد از مهر ماه سال ۱۳۸۳ تا مهر ماه ۱۳۸۵

دکتر سید اسماعیل حسن پور^۱، دکتر سید مهدی موسوی زاده^۲، دکتر خلیل رستمی^۳، دکتر نسیم یونسی^۴

^۱ نویسنده مسئول: دانشیار گروه جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

E-mail: esmail_hassanpour@yahoo.com

^۲ استادیار گروه جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ^۳ رزیدنت جراحی پلاستیک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: دیفکت های اسکالپ ناشی از عوامل مختلف حجم زیادی از اعمال جراحی را بخود اختصاص می دهد و روشهای باز سازی متفاوتی را می طلبد. این عوامل شامل سرطان های اسکالپ، تروما، سوختگی ها، ضایعات عروقی مادرزادی (همانژیوم، مالفورمسیون های عروقی)، اکتسابی، نواقص پوستی مادرزادی مثل آپلازی کوتیس و عفونت ها می باشد. این مطالعه به منظور تعیین علت ضایعات مختلف و انواع روشهای بازسازی بر حسب نوع ضایعه شامل ترمیم اولیه، گرافت پوستی، استفاده از فلپ های پایه دار، اتساع دهنده های نسجی و فلپ های آزاد بافتی و نتایج درمانی آنها طراحی شده است.

روش کار: تحقیق به روش توصیفی بر اساس بررسی پرونده بیماران که بعلت دیفکت اسکالپ طی یک دوره دو ساله تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند انجام شد. متغیرهای سن، جنس، علت ضایعه، محل دیفکت، روش بازسازی بر حسب نوع ضایعه، مدت بستری، مدت پی گیری و عوارض بعد از عمل در فرم های جداگانه ثبت گردید و مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها: ۷۵ بیمار مبتلا به دیفکت اسکالپ مورد بررسی قرار گرفت. سن متوسط بیماران ۴۲ سال بود ۲۳ مورد زن و ۵۲ مورد مرد بود. بیشترین علت دیفکت های اسکالپ، سرطان سلول پایه ی پوست (BCC) اعم از اولیه و عود کرده (۳۹/۲٪) بود. درگیری اسکالپ در ناحیه تمپوروپاریتال بیشتر از سایر قسمت ها بود (۲۵/۳۳٪). اکثر موارد بازسازی با استفاده از متسع کننده بافتی و گرافت پوست بود (به ترتیب ۴۶/۷٪ و ۲۹/۳٪). عوارض عمل بصورت نکرور پارشیل دیستال فلپ یا نکرور قسمتی از گرافت بود که در این موارد گرافت مجدد استفاده شد. دریک مورد عفونت اتساع دهنده نسجی منجر به خارج کردن آن و گذاشتن مجدد در مرحله بعدی شد.

نتیجه گیری: بطور کلی شایعترین علل دیفکت های اسکالپ به ترتیب BCC، سوختگی، تروما و خالهای ملانوسیتی مادرزادی بود و شایعترین روش های بازسازی بکار گرفته شده به ترتیب اتساع دهنده نسجی و گرافت پوستی، فلپ های موضعی و فلپ منطقه ای بوده است.

کلمات کلیدی: دیفکت اسکالپ؛ بازسازی؛ فلپ موضعی؛ گرافت؛ فلپ آزاد؛ اتساع دهنده بافتی

دریافت: ۸۷/۸/۱ پذیرش: ۸۹/۲/۲۸

مقدمه

برخوردار است زیرا از یک طرف بعلت در معرض دید بودن این ناحیه ترمیم با بافت مشابه و مو دار باید انجام شود واز طرف دیگر بعلت مجاورت

بازسازی دیفکت های اسکالپ که حجم زیادی از اعمال جراحی را بخود اختصاص می دهد از اهمیت زیادی