

ارزیابی عوامل خطر در بیماران با مسمومیت دارویی همراه با کاهش سطح هوشیاری

دکتر بابک مصطفی زاده^۱، دکتر اسماعیل فرزانه^۲

^۱ عضو هیئت علمی گروه آموزشی پزشکی قانونی و مسمومیتها، دانشگاه علوم پزشکی شیبد بشتبی، تهران، ایران.

^۲ نویسنده مسئول؛ استادیار پزشکی قانونی و مسمومیتها، دانشکده پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران.

E-mail: e.farzaneh@arums.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف: یکی از محدودیت‌های مشکلات در مدیریت بیماران مبتلا به کاهش سطح هوشیاری ناشی از مسمومیت‌های دارویی، ناتوانی در مصاحبه با بیمار است. هدف از این مطالعه مقایسه خصوصیات دو گروه شامل بیماران با سابقه اقدام به خودکشی قبلی و بدون سابقه اقدام به خودکشی قبلی است.

روش کار: در این مطالعه مقطعی، ۱۹ بیمار با سابقه اقدام به خودکشی و ۶۶ بیمار بدون این سابقه از بین بیمارانی که بدنبال مسمومیت با مواد دارویی در ماههای شهریور، مهر و آبان سال ۱۳۸۸ در مرکز مسمومیت بیمارستانهای آموزشی درمانی در تهران- ایران بسترهای بودند انتخاب شدند. همه بیماران دارای کاهش سطح هوشیاری ناشی از مسمومیت‌های دارویی بودند. وضعیت دموگرافیکی، ویژگیهای ماده دارویی مصرف شده، سابقه بیماریهای قبلی و سابقه مصرف مواد غیرقانونی در بیماران ثبت شد. برای مقایسه بین دو گروه از آزمون کای دو و من ویتنی استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گردید.

یافته‌ها: سابقه اقدام به خودکشی قبلی با نوع ماده دارویی منجر به کاهش سطح هوشیاری ناشی از مسمومیت، ارتباط معنی داری داشت ($p = 0.04$). سابقه بیماری روحی روانی ($p < 0.01$)، تعداد قرص مصرف شده ($p = 0.02$)، فاصله زمانی بین مصرف دارو و رسیدن نیروهای اورژانس به محل ($p = 0.041$)، شرح حال مسمومیت عمده توسط خود بیمار (Self Poisoning) ($p = 0.001$)، درجه کاهش سطح هوشیاری ($p = 0.046$)، اصلاح نشدن سطح هوشیاری بعد از اقدامات اولیه اورژانس ($p = 0.02$) و نیاز برای مراقبت‌های درمانی بعدی و پیشرفت‌های ($p = 0.013$) در بیماران مبتلا به کاهش سطح هوشیاری با سابقه اقدام به خودکشی قبلی در مقایسه با گروه دیگر بیشتر بود. تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سن، جنس و سابقه مصرف مواد غیرقانونی وجود نداشت.

نتیجه گیری: در بیماران بدون سابقه قبلی اقدام به خودکشی شایعترین علت مسمومیت دارویی مواد غیرقانونی و در بیماران با سابقه قبلی اقدام به خودکشی داروهای قانونی و غیرمخدر بود.

کلمات کلیدی: مسمومیت دارویی، اقدام به خودکشی، ارزیابی خطر بیماری

دربافت: ۸۸/۱۰/۲ پذیرش: ۸۹/۲/۲۸

یا غیر عمده باشد. برطبق گزارش برخی از مطالعات

بیمارانی که در بیمارستان برای درمان مسمومیت دارویی عمده^۱ خود بسترهای قانونی و غیرمخدر بود.

مقدمه

مسمومیت‌های دارویی یکی از علل شایع بسترهای شدن بیماران در بیمارستان می‌باشد.

مسمومیت‌های دارویی می‌تواند دارای ماهیت عمده

^۱ Self Poisoning