

بررسی اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهید دکتر رهنمون و افشار یزد

دکتر علی اکبر سالاری^{۱*}، دکتر حمید رضا دهقان^۲

چکیده

مقدمه: سرطان کولورکتال از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش است که در زنان پس از سرطان پستان دومین علت مرگ و میر و در مردان سومین علت مرگ را پس از کارسینومای ریه و پروستات شامل می شود. شیوع آن بیشتر در سنین بالای ۵۰ سال و با افزایش سن، ابتلا به بدخیمی آن بیشتر می شود به همین علت تنها راه بهبود و امید به زندگی در این بیماران تشخیص زودرس بیماری است. **روش بررسی:** این مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بر روی پرونده ۱۹۱ نفر از مراجعین به بیمارستان های شهید دکتر رهنمون و افشار یزد طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ صورت گرفته است. هدف از تحقیق تعیین توزیع فراوانی سرطان کولورکتال از نظر مراحل بیماری، سن، جنس، شغل، محل سکونت، علایم بالینی و نحوه درمان بوده است به همین منظور بیمارانی مورد بررسی قرار گرفته اند که گزارش پاتولوژی آنها یکی از انواع سرطان های کولورکتال بوده است.

نتایج: از ۱۹۱ بیمار مبتلا به کانسر کولورکتال، ۱۸۶ نفر (۹۷/۴٪) آدنوکارسینوما و ۵ نفر (۲/۶٪) لنفوم، داشتند. دامنه سنی بیماران بین سنین ۲۸ تا ۹۴ سال قرار داشت همچنین ۱۲۷ نفر (۶۷٪) از آنها در گروه ۶۰-۶۹ سال، ۷/۴٪ در گروه سنی ۳۹-۲۰ قرار داشتند. از نظر گروه سنی ۱۰۶ نفر (۵۵/۵٪) را مرد و ۸۵ نفر (۴۴/۵٪) را زنان تشکیل داده اند. از نظر سکونت ۶۴/۹٪ شهرنشین و ۳۵/۱٪ روستایی بوده اند. اعمال جراحی انجام شده به ترتیب عبارتند از: APR در ۵۵ نفر (۲۸/۸٪) رزکسیون قدامی و آناستوموز ۴۰ مورد (۲۰/۹٪)، همی کولکتومی راست و چپ هر کدام ۲۵ مورد، رکتوسیگموئیدکتومی و آناستوموز ۱۸ مورد (۹/۴٪) انجام گرفته است. نتایج درمانی نیز به شرح زیر می باشد: ۱۷۷ نفر (۹۲/۷۶٪) پس از عمل جراحی و با بهبودی نسبی و ۵ نفر (۲/۶٪) با رضایت شخصی از بیمارستان مرخص شده، ۳ نفر (۱/۶٪) فوت نموده و فقط ۶ نفر (۳/۱٪) با حال عمومی بد و پس از لاپاراتومی مرخص شده اند.

نتیجه گیری: بیشترین فراوانی علت مراجعه بیماران را ابتلا به سرطان کولورکتال با علایم رکتورازی و بیشترین فراوانی نوع سرطان در آنها را آدنوکارسینوما (۹۷/۴٪) تشکیل داده همچنین بیشترین عمل جراحی انجام شده APR بوده است. با توجه به نتایج پژوهش علت شناسی سرطان های کولورکتال و تحقیقات در زمینه های بیماریابی، تشخیص، درمان و پیش آگهی اینگونه بیماران می تواند در جهت علاج آنها کمک کننده باشد.

واژه های کلیدی: سرطان کولورکتال، تشخیص، درمان، APR (Abdominal Prineal Resection)، AR (Anterior Resection)

مقدمه

عامل اصلی بروز کانسر کولورکتال به طور دقیق شناخته

نشده است اما تحقیقات آزمایشگاهی جدید باعث فهم بهتر اساس مولکولی پیدایش کانسر کولورکتال شده ^(۱) و پیشرفتهای اخیر نظریات موجود درباره پیدایش کانسر کولورکتال را تغییر داده زیرا علوم مولکولی موجب تغییر بنیادین روش های بیماریابی،

* ۱- نویسنده مسئول: دانشیار گروه جراحی عمومی - تلفن: ۰۳۵۱-۸۲۲۴۰۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۴۱۶۶

Email: ali_salari@hotmail.com

۲- پزشک عمومی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
تاریخ دریافت: ۱۳۸۶/۴/۳۰
تاریخ پذیرش: ۱۳۸۶/۷/۱۹