

بررسی پیامدهای ناشی از تروما در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرمان طی سالهای ۸۸-۸۲

دکتر طاهره اشرفگنجوی*، فروغ منگلی**، فرانک نیک نفس**

دریافت: ۸۹/۴/۱۱، پذیرش: ۸۹/۷/۲۰

چکیده:

مقدمه و هدف: تروما در طول حاملگی یک علت مهم بیماری و مرگ و میر مادر و جنین می باشد و به طور کلی در ۸-۶ درصد کل حاملگی ها رخ می دهد. امروزه با افزایش میزان بروز تروماهای غیر نافذ و نافذ، رخداد این حوادث در حاملگی رو به افزایش است. با توجه به شیوع و اهمیت تروما و تناقضاتی که در زمینه عوارض و علل آن وجود دارد، این مطالعه به منظور تعیین پیامدهای ناشی از تروما در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر کرمان صورت گرفت. **روش کار:** در این مطالعه که به صورت توصیفی مقطعی صورت گرفت، با استفاده از اطلاعات موجود در رایانه بایگانی بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان لیستی از کلیه زنان حامله دچار تروما تهیه گردید و افراد از نظر مشخصات فردی، نوع تروما، محل آسیب، عوارض مادری و جنینی بر اساس معاینه بالینی مورد مطالعه قرار گرفتند و موارد ثبت گردید. یافته ها به صورت آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی گزارش گردید.

نتایج: ۸۰ زن باردار دچار تروما مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی افراد ۲۶/۳ سال بود. از نظر سن حاملگی اکثر بیماران (۶۶/۶٪) در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۶ هفته قرار داشتند. میانگین سن حاملگی ۲۶ هفته بود و از لحاظ آماری رابطه معنی داری بین عوارض مادری و جنینی و سن حاملگی یافت شد ($P < 0.05$). شایعترین نوع تروما در ۹۶/۷٪ موارد غیر نافذ بوده و شایعترین علت تروما، در ۶۱/۷٪ موارد تصادفات رانندگی بوده است. شایعترین محل آسیب دیده در بیماران شکم بوده است (۵۶/۴٪) و از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین محل تروما و عوارض مادری و جنینی یافت شد ($P < 0.05$). در مجموع ۱۷ نفر دچار عوارض مادری شدند که در تمامی موارد تروما از نوع غیر نافذ بوده است که این ارتباط از لحاظ آماری معنادار بوده است. شایعترین عارضه مادری ایجاد شده زایمان زودرس بوده است (۳۵/۲۹٪). در مجموع ۸ مورد عارضه جنینی دیده شد که شایعترین آن افت ضربان قلب جنین بوده است. در ۳ نفر (۳/۷۵٪) موارد عمل جراحی انجام شد که نوع آن سزارین و شایعترین اندیکاسیون آن، افت ضربان قلب جنین بوده است.

نتیجه نهایی: با توجه به اینکه تروما در حاملگی چالشی مهم در بخشهای اورژانس میباشد و یکی از شایعترین علل مرگ و میر مادران را در دوران حاملگی تشکیل میدهد و از آنجا که تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک دوران بارداری بررسی و شناسایی دقیق تروما را با مشکل روبرو میکند و با توجه به اهمیت موضوع و به منظور کاهش خطرات ناشی از تروما، اقدام در جهت افزایش سطح ایمنی زنان باردار توصیه می شود.

کلید واژه ها: آستنی / زخمها و آسیب ها / عوارض جنینی / عوارض مادری

مقدمه:

به بستری شدن پیدا میکنند (۱،۲). حداقل ۵ درصد مرگهای جنینی مربوط به عوارض ناشی از تروما می باشد (۳،۴). در طی چند سال اخیر مرگ و میر مادران باردار به دنبال عوارض مستقیم حاملگی و زایمان کاهش یافته است، اما

تروما در طول حاملگی یک علت مهم بیماری و مرگ و میر مادر و جنین می باشد (۱). در ۸-۶ درصد کل حاملگی ها تروما رخ می دهد و ۰/۲ درصد زنان باردار به علت تروما نیاز

* دانشجویار گروه زنان و مامایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

** دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (drferi2020@yahoo.com)