

بررسی ۱۰۴ عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا به روش لاپاراسکوپي در بیمارستان نمازی شیراز، ۱۳۸۲ - ۱۳۸۱

دکتر سیدوحید حسینی

استادیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مجله پزشکی هرمزگان سال هفتم شماره دوم تابستان ۸۲ صفحات ۷۶ تا ۷۹

چکیده

مقدمه: در دو دهه اخیر عمل جراحی با لاپاراسکوپ، خصوصاً برای جراحی کیسه صفرا رواج زیادی یافته است. درمان این گونه بیماران از نظر مدت زمان عمل، مدت زمان بستری، هزینه های درمان و زمان بازگشت به کار نتایج قابل ملاحظه ای در پی داشته است.

روش کار: در این مطالعه توصیفی نتایج درمانی بیمارانی که از فروردین ماه سال ۱۳۸۱ تا شهریور ماه سال ۱۳۸۲ با روش لاپاراسکوپي کیسه صفراي آنها برداشته شده، مورد بررسی قرار گرفته اند. در مجموع ۱۰۴ بیمار شامل ۷۶ زن و ۲۸ مرد تحت عمل جراحی با روش لاپاراسکوپي قرار گرفتند. سن، جنس، علائم، یافته سونوگرافی و یافته هنگام عمل و همچنین طول زمان بستری شدن، مقدار خونریزی، طول عمل و عوارض آن بررسی شد و نتایج با استفاده از روشهای توصیفی ارائه شد.

نتایج: متوسط زمان عمل جراحی ۵۵ دقیقه بود و مقدار خونریزی نیز در اکثر موارد کمتر از ۱۰۰ CC بوده است. متوسط زمان بستری بودن در بیمارستان ۳۶ ساعت و متوسط زمان بازگشت به فعالیت روزانه ۷ روز گزارش گردیده است. عوارض بعد از عمل فقط در ۱ درصد موارد مشاهده شد و فقط در ۲٪ موارد، عمل جراحی منجر به جراحی بازگردید. میزان رضایتمندی بیماران از این روش ۹۶٪ بود.

بحث: با توجه به راحتی این روش، سرعت عمل، کمی عوارض (۱٪) و رضایتمندی بیماران (۹۶٪) توصیه می گردد که این روش بعنوان اولین روش انتخابی، در صورت وجود وسایل لازم و تجربه کافی، مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها: کیسه صفرا - کلسیستکتومی، لاپاراسکوپیک - شیراز

نویسنده مسئول:

دکتر سیدوحید حسینی

بیمارستان شهید فقیهی بخش

جراحی - شیراز - ایران

تلفن: ۰۹۸۷۱۱ ۲۳۳۱۰۰۶

مقدمه:

است که در بسیاری از مراکز در همان روز عمل، بیماران را مرخص نموده اند و بعنوان یک عمل جراحی سرپایی محسوب می شود (۳). با آنکه عوارض و مشکلات بیهوشی نیز در این بیماران چندان تفاوتی با کسانی که به روش باز مورد عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا قرار گرفته اند، نداشته است (۴)، اما تقریباً همه پزشکان معتقدند این روش، روش انتخابی برای بیماران با سنگ علامت دار کیسه صفرا می باشد (۵). در این مطالعه نتایج حاصل از انجام

در دو دهه اخیر در مراکز درمانی جهان، اعمال جراحی با تهاجم کمتر رواج قابل ملاحظه ای یافته است. از جمله این اعمال جراحی می توان به عمل جراحی کیسه صفرا با لاپاراسکوپ (Laparoscopic cholecystectomy) که در اغلب مراکز بصورت معمول انجام می گیرد، اشاره کرد (۱). انجام این کار نتایج خوبی در درمان بیماران از جهت مدت زمان بستری شدن، هزینه های درمان و مدت زمان بازگشت به کار داشته است (۲). مقبولیت این روش به گونه ای بوده