

پیش آگهی در کودکان مبتلا به نفریت لوپوسی

دکتر فاطمه امام قریشی

^۱ استادیار، گروه اطفال دانشکده علوم پزشکی جهرم

مجله پزشکی هرمزگان سال هشتم شماره چهارم زمستان ۸۳ صفحات ۱۹۳ تا ۱۹۷

چکیده

مقدمه: بیماری لوپوس اریتروماتوزوس یک بیماری سیستمیک است که ارگانهای مختلف را درگیر می‌کند. مطالعه حاضر به منظور بررسی نفریت لوپوسی در کودکان، سرانجام آن و فاکتورهای مرتبط با سرانجام آن صورت گرفته است.

روش کار: مطالعه گذشته‌نگر بر روی ۴۸ کودک مبتلا به نفریت لوپوسی با مراجعه به پرونده بیمارستانی آنان صورت گرفته است. خصوصیات بالینی و اپیدمیولوژیک، سرانجام بیماران در مدت پیگیری ثبت گردیده و فاکتورهای مؤثر در سرانجام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. احتمال بقای ۵ سال بیماران و بقای کلیه محاسبه گردید.

نتایج: کودکان مورد بررسی دارای محدوده سنی ۱۱-۳ سال و اکثریت دختر بودند. تمام بیماران در زمان مراجعه پروتئینوری و اکثریت خون در ادرار داشتند. شایعترین نوع پاتولوژی کلاس چهار نفریت لوپوسی با ۴۲/۵۹ درصد بوده است. در پیگیری ۲۹/۲ درصد دچار نارسایی مزمن کلیوی و ۲۵ درصد فشار خون بالا شدند. مهمترین فاکتور مؤثر در پیش آگهی‌های بیماران وجود فشار خون بالا در زمان اولین مراجعه و کلاس ۴ نفریت لوپوسی بود. میزان بقای کلیه بعد از ۵ سال ۶۳/۸ درصد بود.

نتیجه‌گیری: محدوده سنی، شیوع جنسی و شیوع انواع پاتولوژی نفریت لوپوسی در کودکان در مطالعه حاضر با اکثریت مطالعات همخوانی دارد. با توجه به اینکه فشار خون از فاکتورهای مؤثر در پیش آگهی بیماران است باید توجه بیشتری به درمان بیماران با فشار خون بالا در زمان مراجعه صورت گیرد. بدتر بودن شانس بقای کلیه در بیماران مطالعه حاضر نیاز به بررسی بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها: نفریت لوپوسی - پیش آگهی - میزان بقا - کودک

نویسنده مسئول:

دکتر فاطمه امام قریشی

گروه اطفال - علوم پزشکی

جهرم

جهرم - ایران

تلفاکس: ۳۳۳۱۵۳۰ ۷۹۱ ۹۸+

مقدمه:

فاکتورهای بالینی و پاتولوژیک متفاوتی در پیش آگهی بیماران نقش دارند از جمله تظاهر به صورت سندرم نفروتیک، شدت پروتئینوری، سن بیمار، نژاد و جنسیت (۹، ۱۳). هدف از مطالعه حاضر بررسی بالینی و پاتولوژیک نفریت لوپوسی در کودکان ایرانی و تأثیر عوامل مختلف در پیش آگهی با توجه به منطقه جغرافیایی است.

روش کار:

مطالعه گذشته‌نگر بر روی ۴۸ کودک مبتلا به لوپوس نفریت مراجعه‌کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه

بیماری لوپوس اریتروماتوزوس یک بیماری سیستمیک است که ارگانهای مختلف را درگیر می‌کند و با علائم بالینی متفاوت تظاهر می‌کند (۱). شیوع آن در دختران بیشتر از پسران می‌باشد و در کودکان معمولاً به صورت حاد تظاهر می‌کند. ۸۰-۶۰ درصد بیماران درگیری کلیوی وجود دارد (۲، ۳). تظاهرات کلیوی از حالت بدون علامت تا خون در ادرار، پروتئینوری، سندرم نفروتیک، گلو مرونفریت و یا نارسایی کلیوی می‌باشد (۴، ۵). بر اساس تقسیم‌بندی سازمان بهداشت جهانی بیماران از نظر پاتولوژی به شش گروه تقسیم می‌شوند که دارای شیوع و پیش آگهی متفاوتی می‌باشند (۶، ۸).