



مورد نگاری

گزارش یک مورد استفاده از شریان توراسیک داخلی جهت ایجاد شنت بین جریان خون سیستمیک و پولمونر

*کامبیز علیزاده^۱ MD، علی صادقپور^۲ MD، کیوان علیزاده^۳ MD

^۱دستیار جراحی قلب، ^۲استادیار گروه جراحی قلب، ^۳دستیار قلب و عروق - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران،

بیمارستان قلب شهید رجایی

تاریخ دریافت: ۸۴/۲/۸ - تاریخ پذیرش: ۸۶/۲/۶

خلاصه

مقدمه: روشهای متعددی برای ایجاد شنت بین گردش خون سیستمیک و پولمونر مورد استفاده جراحان قرار گرفته است که در حال حاضر متداولترین آنها استفاده از روش اصلاح شده بلالک - توسیگ^۱ است. این شیوه حتی جهت ایجاد شنت در نوزادان که شریان پولمونر کوچک دارند بسیار مؤثر است. در این گزارش استفاده از شریان توراسیک داخلی جهت ایجاد ارتباط بین سیستم جریان خون سیستمیک و پولمونر در یک دختر ۱۵ ساله که در کودکی تحت عمل اصلاح شده بلالک - توسیگ قرار گرفته بود و این شنت عملکرد مناسب نداشت معرفی گردد.

کلمات کلیدی: شنت سیستمیک، پولمونر، شریان اینترنال توراسیک

* تهران - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دستیار جراحی قلب، بیمارستان قلب شهید رجایی - نویسنده رابط

¹ Modified Blalock - Taussig