

مقایسه حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ در زنان دارای سنگ کیسه صفرا قبل و بعد از عمل جراحی

ایرج میرخان (گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور ارومیه نویسندهٔ مسئول، ایمیل Mirkhan_iraj@yahoo.com)
سیف اله رضایی (استادیار گروه جراحی عمومی دانشگاه ارومیه و فوق تخصص جراحی توراکس و لاپاراسکوپی)
زهرا عمرانی (دکترای پزشکی عمومی دانشگاه ارومیه)

چکیده

یکی از بیماری‌های شایع در زنان سنگ کیسه صفرا است که مشکلات عمده روانی-هیجانی را در زنان ایجاد می‌کند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ در زنان دارای سنگ کیسه صفرا قبل و بعد از عمل جراحی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعه‌کننده به کلینیک تدبیر ارومیه با تشخیص سنگ کیسه صفرا در زمستان ۱۳۹۷ را شامل می‌گردد. تعداد ۳۰ بیمار با روش نمونه‌گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو مرحله قبل و بعد از عمل جراحی پرسشنامه‌های حساسیت اضطرابی ریس و همکاران و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر را تکمیل نمودند. داده‌ها با آزمون t وابسته تحلیل شد. نتایج نشان داد که نمرات زنان بیمار در حساسیت اضطرابی ($p < 0/05$) و اضطراب مرگ ($p < 0/01$) در دو مرحله بررسی تفاوت معنی‌دار وجود داشت و نمرات هر دو متغیر بعد از عمل جراحی کاهش معنی‌داری داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که زنان دارای سنگ کیسه صفرا قبل از عمل جراحی حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ بالایی را تجربه می‌کنند که می‌توان از طریق برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی، زمینه کاهش حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ آنها را مهیا نمود.

واژگان کلیدی: حساسیت اضطرابی، اضطراب مرگ، سنگ کیسه صفرا

مقدمه

از اختلالات شایع در زنان، تشکیل سنگ کیسه صفرا ۱۱ می‌باشد. این سنگ‌ها در کودکان و بالغین جوان به ندرت دیده می‌شوند ولی با افزایش سن شیوع آن به تدریج افزایش می‌یابد. این بیماری در زنان