

مقایسه اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان با روان‌نرجور خویی عادی، خفیف، متوسط و شدید

سمانه عنبر دباغی یان (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه تبریز (نویسنده
مسئول)

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه میزان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در بین دانشجویان با روان‌نرجور خویی عادی، خفیف، متوسط و شدید می‌پردازد. بدین منظور ۱۷۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تبریز به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش‌نامه مورد استفاده برای سنجش شدت روان‌نرجور خویی پرسش‌نامه روان‌نزدی کوندو (K.N.P.I) بود. برای سنجش شدت اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی پرسش‌نامه محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد و روش تحلیل واریانس یک‌راهه (ANOVA) به کار رفت. به‌طور کلی، نتایج ANOVA نشان داد که شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان با دامنه متفاوت روان‌نرجور خویی معنی‌دار ($F(3) = ۰/۵۵۴$ ، $p < ۰/۰۰۱$) / $p < ۰/۰۰۱$ / $p < ۰/۰۰۱$ = ۶۸/۶۱ است. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که میانگین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دو گروه خفیف و عادی در سطح ($p < ۰/۰۱$) معنی‌دار است ($p < ۰/۰۱$). میانگین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دو گروه متوسط و عادی نیز در سطح ($p < ۰/۰۱$) معنی‌دار است. علاوه بر این، میانگین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دو گروه عادی و شدید نیز معنی‌دار است ($p < ۰/۰۱$) در حالی که میانگین اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در گروه‌های خفیف با متوسط، خفیف با شدید و متوسط با شدید معنی‌دار نبود ($p > ۰/۰۵$).

کلیدواژه: روان‌نرجور خویی، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی، تحلیل واریانس، دانشجویان