کارسینوم سلول بازال غیرمعمول (قارچی شکل) بر روی خال کوبی: گزارش یک مورد

دکترمحمدامیدیان[1]، دکترنپتون عمادمستوفی[2]

۱ـ دانشیار، گروه پوست، ۲ـ استادیار، گروه آسیب شناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی اهواز

کارسینوم سلول بازال تومور بدخیمی است که ممکن است در پوست آسیب دیده در اثر اشعهٔ آفتاب و اشعهٔ یونیزان و یا بر روی اسکارهای سوختگی و اسکار واکسیناسیون ایجاد گردد. انواع بالینی کارسینوم سلول بازال عبارتنداز ندولر، morphea type، سطحی و پلیپوئید.

واکنش‌های خال کوبی از نظر بافت شناسی متفاوتند و سه نوع اصلی آسیب شناسی پوستی همراه با خال کوبی عبارتند از : ۱ـ واکنش آلرژیک، گرانولوماتو و لیکنوئید، ۲ـ واکنش تلقیحی و عفونی، ۳ـ واکنشهای ضایعاتی که بطور اتفاقی در خال کوبیها ایجاد می‌شوند.

در اینجا ما بیماری را معرفی می کنیم که یک ضایعهٔ قارچی شکل پایه‌دار به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای شفاف بر روی لب بالا و درست روی خط خال کوبی از حدود ۲ سال قبل داشت که در آسیب‌شناسی ضایعه، کارسینوم سلول بازال تأیید گردید. بنظر می‌رسد که خال کوبی در ایجادونیزشکل غیرمعمول ضایعه مؤثر باشد.

واژه‌های کلیدی: کارسینوم سلول بازال، خال کوبی، قارچی شکل

فصلنامه بیماریهای پوست، زمستان ۱۳۸۲؛ ۲۶: ۱۱۶-۱۱۹

معرفی بیمار

بیمار خانمی ۷۲ ساله، خانه‌دار و شهرنشین بود که بخاطر زخم بالای لب مراجعه کرده و سابقهٔ آن را از حدود ۲ سال قبل ذکر می کرد. در معاینه فیزیکی، ضایعه به شکل قارچ یا چتری شکل رشد کرده بود، بطوریکه نواحی ضایعه و زبرلبه‌های کناری آن آزاد ولی در تماس با پوست و ضایعه پایه‌دار بود. گسترش ضایعه از بالا به داخل سوراخ بینی سمت چپ بطوریکه سوراخ بینی را مسدود و نفس کشیدن را برای بیمار مشکل کرده بود و از پایین بر روی لب بالا و تا حدودی لب پایین را نیز پوشانیده بود. ضایعه به رنگ قرمز مایل به قهوه‌ای و کمی شفاف، دارای مختصر کراست و به ابعاد ۲ ×۲ سانتیمتر بود. محل ضایعه دقیقاً روی خط آبی رنگ خال کوبی قرار داشت (تصاویر شماره ۲ و ۱). از ضایعه نمونه برداری انجام شد که سلولهای توموری بازالوئید را نشان می‌داد(تصویر شماره ۳). بیمار سابقهٔ سرطان پوستی در خود و خانواده، رادیوتراپی و یا مصرف املاح آرسینیک را ذکر نمی کرد.

بحث

کارسینوم سلول بازال تومور بدخیمی است که ممکن است در اثر آسیب‌های پوستی ناشی از نور آفتاب و اشعهٔ یونیزان(۱) و یا بر روی اسکارهای سوختگی و اسکار واکسیناسیون ایجاد شود(۱). در بیمار مورد مطالعه، ضایعه بر روی خال کوبی ایجاد شده که ممکن است ناشی از

مؤلف مسئول: دکتر محمد امیدیان ـ اهواز، بیمارستان امام، گروه پوست