

گزارش کوتاه

سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مورد تبخال تناسلی

دکتر لیلی چمنی تبریز*^۱، دکتر حجت زراعتی^۲، سهیلا عسگری^۳، دکتر سرور اسدی^۴، دکتر سعید زارعی^۵

۱- استادیار، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، گروه پژوهشی عفونت‌های تولیدمثل، پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا، تهران. ۲- استادیار آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور آمار پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا، تهران. ۳- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران - شعبه بین‌الملل، کیش. ۴- استادیار گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران. ۵- پزشک عمومی، پژوهشکده تحقیقات آنتی‌بادی منوکلونال، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا، تهران.

چکیده

زمینه و هدف: بیماری تبخال تناسلی در دنیا و در آسیا رو به افزایش است. تحقیقات نشان داده، داشتن آگاهی در مورد بیماری منجر به تغییر رفتارهای پرخطر جنسی و در نتیجه اجتناب از خطر می‌گردد. این تحقیق به منظور تعیین سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مورد تبخال تناسلی صورت پذیرفت.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی روی ۴۰۹ دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران در پاییز ۱۳۸۳ انجام گرفت. ابزار این تحقیق پرسشنامه بود و داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-13 و آزمون‌های آماری تی مستقل، کای دو، من‌ویتنی و کروسکال‌والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سطح آگاهی کلی از بیماری $26 \pm 26/5$ درصد تعیین گردید. همچنین میانگین و انحراف معیار سطح آگاهی از ماهیت بیماری و راه‌های انتقال بیماری به ترتیب $24/2 \pm 23/7$ درصد و $36 \pm 30/5$ درصد به دست آمد. ۱۸/۸ درصد از شرکت کنندگان از علائم بیماری آگاهی داشتند و میزان آگاهی دانشجویان در خصوص درمان و چگونگی پیشگیری به ترتیب ۱۶/۴ درصد و ۴۶/۲ درصد بود. براساس تحلیل انجام شده بین سن، وضعیت تاهل و مقطع تحصیلی با سطح آگاهی در حیطه‌های مختلف بیماری ارتباط معنی‌دار آماری به دست آمد ($P < 0/05$). سطح آگاهی دانشجویان دانشکده‌های علوم فنی بیش از دانشکده‌های علوم انسانی بود ($P < 0/05$).

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که اکثریت جامعه مورد مطالعه در زمینه بیماری آگاهی کافی نداشتند و تمایل به داشتن اطلاعات بیشتری از بیماری نشان دادند. پیشنهاد می‌شود در مراکز آموزشی راجع به بیماری‌های منتقله از راه تماس جنسی و تبخال تناسلی آموزش داده شود.

کلید واژه‌ها: آگاهی، تبخال تناسلی، دانشجویان، ایران

*نویسنده مسؤول: دکتر لیلی چمنی تبریز، پست الکترونیکی: lchamani@gmail.com

نشانی: تهران، پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابن سینا، صندوق پستی ۱۷۷-۱۹۸۳۵.

تلفن: ۲۲۴۳۲۰۲۰ (۰۲۱)، نمابر: ۲۲۴۳۲۰۲۱

وصول مقاله: ۸۶/۶/۱۲، اصلاح نهایی: ۸۶/۱۲/۴، پذیرش مقاله: ۸۷/۲/۱۱