

دررفتگی آسیبی هیپ در یک کودک

(گزارش یک مورد)

دکتر محمدتقی پیوندی^(۱)، دکتر امیررضا کچویی^(۲)، دکتر سارا عامل فرزاد^(۳)

Traumatic Hip Dislocation in an Infant (Report of One Case)

Mohammad Taghi Peivandi, MD; Amir Reza Kachooei, MD; Sara Amel Farzad, MD
«Mashhad University of Medical Sciences»

خلاصه

دررفتگی هیپ به دلیل ضربه در کودکان نادر می‌باشد و در کودکان زیر ۵ سال به دلیل شلی لیگامانی با آسیب کمتری اتفاق می‌افتد. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد دررفتگی پستی هیپ در یک کودک ۱۹ ماهه به دلیل سقوط از دو پله بود. **واژه‌های کلیدی:** دررفتگی ران، کودک، ضربه

Abstract

Traumatic hip dislocation is rare in children. Ligamentous laxity is often a reason for this occurrence usually with a minor trauma.

Keywords: Hip Dislocation; Infant; Trauma

دریافت مقاله: ۴ ماه قبل از چاپ مراحل اصلاح و بازنگری: ۲ بار پذیرش مقاله: ۲ ماه قبل از چاپ

مقدمه

دررفتگی هیپ در کودکان نادر می‌باشد و در اطفال زیر ۵ سال به دلیل شلی لیگامانی با آسیب کمتری اتفاق می‌افتد^(۱). تشخیص موارد دررفتگی آسیبی مشکل است و می‌تواند در موارد عدم تشخیص به عوارض جدی و حتی جاناندازی باز منجر گردد. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد دررفتگی پستی هیپ در کودک ۱۹ ماهه به علت سقوط از دو پله بود.

گزارش مورد

یک دختر بچه ۱۹ ماهه به دنبال سقوط از پله با درد و تغییر شکل هیپ راست به بخش سوانح بیمارستان شهید کامیاب

(امدادی) مشهود مراجعه کرد. در معاینه بالینی کوتاهی اندام تحتانی چپ، درد و محدودیت حرکتی هیپ وجود داشت ولی علائم عصبی و عروقی طبیعی بود. این کودک، فرزند اول خانواده بود و هیچ‌گونه سابقه بیماری در خانواده درجه اول نداشت. معاینه سایر مفاصل از نظر دامنه حرکتی و شلی لیگامانی طبیعی بود. هیپ راست مختصری در حالت خم، اداکسیون و چرخش داخلی بود. پرتونگاری ساده از بیمار، جابه‌جایی پستی و بالایی سرفمور راست بدون شکستگی همراه نشان داد (شکل ۱-الف). براساس پرتونگاری و معاینه فیزیکی تشخیص دررفتگی پستی هیپ گذاشته شد و بیمار به اتاق عمل اورژانس منتقل گردید. تحت بیهوشی عمومی دررفتگی هیپ، با روش بسته به سهولت جانداخته شد. معاینه مفصل هیپ در حالت ۹۰° خم شدن هیپ و بدون چرخش هیپ پایدار بود. یک روز بعد از

(۱) و (۲): ارتوپد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

(۳): پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محل انجام تحقیق: مشهد، بیمارستان شهید کامیاب (امدادی)

نشانی نویسنده رابط: مشهد، بیمارستان امدادی، بخش ارتوپدی

دکتر محمدتقی پیوندی E-mail: drpeivandi@yahoo.com