

ویژگی‌های روان‌سنجدی نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا در بیماران ایرانی مبتلا به کمردرد

*حسن جعفری^۱، اسماعیل ابراهیمی^۲، مهیار صلواتی^۳، محمد کمالی^۴، لادن فقی^۵

۱۵

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجدی نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپاکه به عنوان یک ابزار رایج در دنیا برای سنجش میزان ترس از حرکت و صدمه در بیماران کمردردی به کار می‌رود بود.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و متداول‌بُریک که از نوع اعتبار‌سنجدی و ابزارسازی می‌باشد، ۲۳۲ نفر بیمار مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به برخی کلینیکها و بیمارستانهای در دسترس شهر تهران با نمونه‌گیری ساده انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و ۶۱ نفر از آنها برای آزمون مجدد جهت سنجش تکرار پذیری شرکت کردن. جهت اعتبار‌سنجدی خصوصیات روان‌سنجدی نسخه ایرانی مقیاس ترس از حرکت تمپا همخوانی درونی، همبستگی آیتم با نمره کل، تکرار پذیری آزمون – بازآزمون و اعتبار سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزارها و آزمون‌های به کار رفته علاوه بر مقیاس ترس از حرکت تمپا، آزمون آنالوگ دیداری برای سنجش شدت درد، آزمون باورهای منجر به ترس - اجتناب جهت سنجش ترس از درد در فعالیتهای بدنی و شغل و آزمون ناتوانی رولند - موریس جهت سنجش ناتوانی بالینی بودند. روش‌های آماری شامل محاسبه ضریب‌های آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و همبستگی درون گروهی (ICC) و آزمون‌های کولموگروف - اسمیرنوف و تی زوجی بود.

یافته‌ها: همخوانی درونی مقیاس خوب و ضریب آلفای کرونباخ برای ۱۷ آیتم آن معادل ۰/۹۶ بود. همبستگی آیتم - نمره کل برای هر آیتم محاسبه گردید که به غیر از چهار آیتم، سایر موارد همبستگی مناسبی را نشان دادند. ضریب همبستگی درون گروهی در ارزیابی تکرار پذیری ۰/۸۶ به دست آمد. جهت محاسبه اعتبار ساز، ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس ترس از حرکت تمپا با دو خرده‌مقیاس فعالیت بدنی و شغل آزمون باورهای منجر به ترس - اجتناب به ترتیب ۰/۵۹ و ۰/۳۲ و با آزمون ناتوانی رولند - موریس ۰/۶۰ به دست آمد.

نتیجه گیری: نسخه فارسی مقیاس ترس از حرکت تمپا دارای روایی و پایایی لازم جهت سنجش ترس از حرکت/صدمه در بیماران کمردردی ایرانی می‌باشد و قبل استفاده در کلینیک‌ها و مراکز درمانی و یا جهت اهداف تحقیقی است.

کلید واژه‌ها: مقیاس ترس از حرکت تمپا / ترس از حرکت - صدمه / کمردرد / خصوصیات

روان‌سنجدی / ناتوانی

- ۱- دکترای فیزیوتراپی، استادیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
- ۲- دکترای فیزیوتراپی، استاد دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
- ۳- دکترای فیزیوتراپی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- ۴- دکترای آموزش بهداشت، دانشیار دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
- ۵- دکترای روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۸۷/۴/۲۲

تاریخ پذیرش مقاله: ۸۷/۹/۲۸

*آدرس نویسنده مسئول:

تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه فیزیوتراپی

تلفن: ۰۲۲۲۸۰۵۱

*E-mail:hjafari@iums.ac.ir