

موردنگاری

گزارش یک مورد سندرم وارفارین جنینی

غلامعلی معموری^۱ MD، *حسن بسکابادی^۲ MD، حجت ا... احتشام منش^۳ MD

^۱استاد (فوق تخصص نوزادان)، ^۲استادیار (فوق تخصص نوزادان)، ^۳دستیار تخصصی بیماریهای کودکان

بیمارستان قائم (عج)

تاریخ دریافت: ۸۴/۱۲/۶ - تاریخ پذیرش: ۸۵/۴/۱۸

خلاصه

مقدمه: وارفارین یک داروی ضد انعقاد خوراکی که در اختلالات قلبی - عروقی مصرف می شود. عمل آن کاهش سنتز فاکتورهای وابسته به ویتامین K است. اگر چه در حاملگی کم عارضه تر از هپارین است ولی براحتی از جفت رد میشود و اثرات نامطلوبی تحت عنوان سندرم وارفارین جنینی ایجاد می کند، که در مطالعات متعدد شایعترین آنها هیپوپلازی بینی، اختلالات اسکلتی و کلسیفیه شدن اپی فیزها گزارش شده است مواجه شدن جنین با وارفارین به ویژه در ۳ ماهه اول حاملگی خطر امبریوپاتی جنینی (هیپوپلازی بینی و اپی فیز منقوطی) را افزایش می دهد.

معرفی بیمار: یک نوزاد با علایم جدید که تاکنون گزارش نشده (آژنزی فمور، آژنزی کورپوس کالوزوم، دررفتگی رادیال و اولنار) که حاصل یک زایمان پست ترم، که در تمام طول حاملگی مادر روزانه ۲/۵ میلی گرم وارفارین مصرف می کرده است را گزارش گردیده است. علایم اصلی مشاهده شده در این نوزاد شامل (براکیوسفالی، هیدروسفالی، آژنزی کورپوس کالوزوم، اندامهای کوتاه، دفورمیته انگشتان، تأخیر رشد داخل رحمی، پل بینی فرو رفته و پهن، دررفتگی دو طرفه لگن و اولنار و رادیال) می باشد.

کلمات کلیدی: وارفارین، هیپوپلازی، آژنزی، امبریوپاتی، جنین

* مشهد، بیمارستان قائم (عج)، بخش نوزادان، تلفن: ۸۰۱۲۵۰۲ - ۸۴۱۲۰۶۹، نویسنده رابط

E- mail: h.boskabady@yahoo@.ic.ir